

Waarop moet u letten als u gelijktijdig een antier (geneesmiddel) gebruikt?
Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdünnende middelen) kan de neiging tot bloeden toenemen. Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol wordt de kans op maagklachten groter.

Invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines
Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten. Indien zich echter in incidentele gevallen duizeligheid voordoet, dient hiermee rekening te worden gehouden.

Wat te doen bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding?
Acetylsalicylzuur mag in de zwangerschap uitsluitend op advies van de arts worden gebruikt; acetylsalicylzuur mag niet worden gebruikt gedurende de laatste 3 maanden van het zwangerschap. Gebruik tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Dosering
Volwassenen: 3-8 bruisabletten per keer, maximaal 12 bruisabletten (= 4000 mg) per 24 uur, verdeeld over 4 of 6 keer giften.

Kinden 12 jaar en ouder: 1 bruisablet per keer, maximaal 6 bruisabletten (= 2000 mg) per 24 uur, verdeeld over 3 giften.

De bij tussen twee doses moet bij kinderen in ieder 4 uur bedragen.

Wanneer de klachten (voortschieten) weer opkomen, is herhaalde toediening mogelijk, maar de maximale dosering (volwassenen: 4000 mg per dag; kinderen 12 jaar en ouder: 2000 mg per dag) mag niet worden overschreden.

Aanwijzingen voor het gebruik
De bruisabletten oplossen in een glas water en de oplossing opdrinken. Indien een snel effect gewenst is, verduin toediening op de buik (naast), of tenminste een half uur vóór de maaltijd de voorkeur. Wanneer maagklachten optreden, dienen de tableten tijdens of vlak na de maaltijd te worden ingenomen.

Wat te doen bij overdosering?
Bij een mogelijke overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, missen, verwardheid, misselijkheid, overgeven en maagpijn.
Bij een ernstige overdosering treden op: hyperventilatie, transpireren, nauwe pupil, ontsteking, hallucinaties en apnoë; in zeer ernstige gevallen bestaat bewusteloosheid op en kan ademhalingsstilstand ontstaan.

Letten aan te hoge dosis is ingenomen en op zich bevinden van overdosering voorzorg, dient een arts te worden geraadpleegd. Deze afdeling of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Aanwijzingen voor het bewaren
Alka-Seltzer dient in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15°C-25°C) te worden bewaard; niet in een vochtge omgeving (bedkamer). De laatste gebruiksaanwijzing is op de verpakking van het product. Niet te gebruiken na: 1) en dat de strip (na het de afkorting LKZ).

Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Verpakking
Alka-Seltzer is verkrijgbaar in een verpakking met 20 bruisabletten; 10 strips met elk 2 bruisabletten.

RVG-nummer
Alka-Seltzer is in het register ingeschreven onder RVG 01147.

Augustus 1984



Alka-Seltzer®

bruisablet 324 mg acetylsalicylzuur (acetosal)

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderende inzichten gewijzigd zijn.

Naam en adres van de vergunninghouder
Bayer G. V.
Evangeliweg 1
3641 DT Mijnesluis
Tel. 0297/290363

Naam van de fabrikant
Bayer AG, Duitsland

Naam van het geneesmiddel
Alka-Seltzer

Samenstelling
Per bruisablet 324 mg acetylsalicylzuur (acetosal) met buffer. Een bruisablet bevat 442 mg natrium. De bruisabletten zijn aan de ene zijde vlak en aan de andere zijde voorzien van een opstaande rand en de afkorting Alka-Seltzer (in het blauw).

Werking
Acetylsalicylzuur werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend.

Waarvoor wordt Alka-Seltzer gebruikt?

- Alka-Seltzer kan worden gebruikt bij:
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
 - koorts en pijn na vaccinatie
 - hoofdpijn
 - kiespijn
 - zenuwpijn
 - epijn
 - spierpijn
 - menstruatiepijn
 - reumatische pijn.

Wanneer mag Alka-Seltzer niet worden gebruikt?

- Alka-Seltzer mag niet worden gebruikt door:
- maagzweer die bij eerder gebruik maagpijn kregen
 - patiënten met een maag-voorzweer
 - patiënten met maag- of darmbloedingen
 - patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of andere acetylsalicylische pijnstillers (bv. van hoge leeftijdspatiënten; deze kunnen een ernstig krijgen of aanvallen)
 - patiënten met leveraandoeningen
 - patiënten met ernstige nierklachten
 - patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie en hypoprothrombinemie)
 - patiënten die met ontstollingsmiddelen worden behandeld
 - patiënten met een reumatische (reuma) ziekte.

Bijwerkingen

- Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:
- maagklachten (dan gebruik stoppen)
 - hooftreuzen (het meegedrukt kanaal (akroverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of voortdurend gebruik van dit lijden tot bloedarmoede (overmatig bloedverlies) in de ontlasting)
 - verlaging van de bloedingsstijd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Veelvuldig gebruik wordt afgeraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen. Gebruik geen acetylsalicylzuur vóór of na het breken van tanden of kiezen. Neem geen acetylsalicylzuur in kort vóór of kort na gebruik van alcohol. Bij indigestie met waterpokken of griep mag acetylsalicylzuur niet worden gebruikt vóór de ziekte wordt weggevoerd.