

IberoLax®



SACHETS

MEDISCH HULPMIDDEL CE₀₄₂₆

Te gebruiken bij obstipatie (verstopping)

1. IDENTIFICATIE, SAMENSTELLING EN DOEL VAN HET MEDISCH HULPMIDDEL

IBEROLAX is een laxeermiddel dat door zijn osmotische werking de stoelgang op natuurlijke wijze reguleert. Het wordt niet in de darmen opgenomen of gefermenteerd, irriteert het slijmvlies niet en wordt uitgescheiden in de ontlasting. IBEROLAX is met name geschikt bij verstopping en af en toe optredende onregelmatige stoelgang. Doordat het water vasthoudt, maakt IBEROLAX de ontlasting zachter. Dit vergemakkelijkt de stoelgang zonder kramp of buikpijn te veroorzaken en zonder dat er plotselinge aandrang ontstaat. Ook bij langdurig gebruik blijft IBEROLAX effectief. Bij langer dan 2 weken gebruik, raadpleeg een arts.

1.1. Bestanddelen

- Elk sachet bevat 10 g macrogol 3350.

2. VERPAKKING

IBEROLAX is verkrijgbaar als poeder voor drank. Het doosje bevat 10 wegwerpsachets.

3. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING

Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 2 jaar (max. 12 kg): 1 sachet (10 g) per dag.
Kinderen in de leeftijd van 2 tot 11 jaar (12-20 kg): 1-2 sachets (10 g per sachet) per dag.
Kinderen ouder dan 11 jaar en volwassenen (of met een gewicht van meer dan 20 kg): 1-3 sachets (10 g elk) per dag.
Elk sachet moet in 62,5 ml niet-bruisend water (ongeveer een half glas) worden opgelost.

De dagelijkse dosis kan worden verdeeld over meerdere innamemomenten. De dosis kan worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van hoe de betreffende persoon reageert op de behandeling. Raadpleeg bij vragen een arts. Gebruik het product bij kinderen uitsluitend na overleg met een arts. Meer dan 3 sachets per dag zijn normaal gesproken niet nodig.

4. CONTRA-INDICATIES

Gebruik IBEROLAX niet bij:

- darmstenose
- darmperforatie
- inflammatoire darmziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa)

Niet gebruiken bij darmobstructie

Er is geen ervaring met het gebruik van IBEROLAX bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Gebruik IBEROLAX daarom uitsluitend na overleg met een arts

Bij patiënten met nierinsufficiëntie hoeft de dosis niet te worden aangepast. De maximale duur van een behandeling met IBEROLAX is dan 2 weken. Zo nodig kan de behandeling worden herhaald. Raadpleeg hiervoor een arts.

Langduriger gebruik kan nodig zijn. Verstopping kan het gevolg zijn van geneesmiddelen, pijnstillers (opioïden) en middelen tegen de ziekte van Parkinson (anticholinergica). Ook multipole sclerose en de ziekte van Parkinson kunnen verstopping veroorzaken. Raadpleeg hiervoor een arts.

5. BIJWERKINGEN

Bij doses die nodig waren om een therapeutisch effect te bereiken, zijn nog nooit ernstige bijwerkingen gemeld. Er kunnen zich soms maag-darmaandoeningen voordoen, evenals darmgeluiden, buikpijn, misselijkheid en milde diarree (vooral in het begin). In zeldzame gevallen kunnen er overgevoelighedsreacties optreden (uitslag en bultjes).

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer er bijwerkingen ontstaan, ook als deze niet in deze gebruiksaanwijzing staan. Raadpleeg uw arts als de symptomen niet verdwijnen.

Als u vergeet een dosis in te nemen, wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis en neem geen dubbele dosis.

Interacties met geneesmiddelen

Tot nu toe zijn er geen interacties met geneesmiddelen bekend. Toch is het goed om na het innemen van geneesmiddelen of andere medicatie (ook homeopathische middelen) of voedingssupplementen minimaal 2 uur te wachten met het innemen van IBEROLAX. De osmotische werking van macrogol en de snellere passage door het maag-darmkanaal kunnen namelijk de werkzaamheid van deze middelen negatief beïnvloeden.

Raadpleeg echter uw arts wanneer u andere behandelingen ondergaat voordat u IBEROLAX gebruikt.

6. BEWAREN

Bewaar IBEROLAX op een droge plaats en uit de buurt van directe warmte- of lichtbronnen. Open het sachet vlak voordat u het gebruikt. Beschadigde sachets niet gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaren bij een temperatuur lager dan 25 °C.

7. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

Het drankje moet direct voor gebruik worden klaargemaakt.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 maanden.

Aanbevolen wordt de voorgestelde hoeveelheden niet te overschrijden. Hogere doses kunnen namelijk onverwachte bijwerkingen veroorzaken.

Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mogen IBEROLAX uitsluitend gebruiken na overleg met hun arts.

Aangeraden wordt om tijdens de behandeling met IBEROLAX gezond te eten en eventueel ORS in te nemen. Het is verstandig uw arts te raadplegen.

Niet langer dan 30 dagen achter elkaar gebruiken. Raadpleeg uw arts als de symptomen aanhouden. Niet gebruiken wanneer het product niet wordt verdragen. Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor de bestanddelen en polyethyleenglycol. Elk sachet kan worden weggegooid en moet uitsluitend worden geopend wanneer het meteen wordt gebruikt.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum (zie verpakking). De uiterste gebruiksdatum geldt voor het product zoals dat in de onaangebroken sachets wordt bewaard.

9. VERWIJDERING

Na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum dient het hulpmiddel te worden verwijderd overeenkomstig de voorschriften voor afvalbeheer. Vraag uw apotheker wat te doen met het product.

Zorg ervoor dat het product of de verpakking ervan in geen geval in het milieu terecht komt.

 SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIË



Distributeur:
Bayer BV, Consumer Health Division,
Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht
Laatste herziening: 01.2018

Bayer
03009010/1