



# ROTER CYSTIBERRY®

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het medisch hulpmiddel Roter Cystiberry® gaat gebruiken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals te raadplegen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### Wat is een blaasontsteking?

Blaasontsteking is een gezondheidsprobleem wat wereldwijd miljoenen mensen per jaar treft. Vrouwen worden 50 keer vaker getroffen dan mannen. Bijna de helft van alle vrouwen ervaart ten minste één blaasontsteking in hun leven en ongeveer 20% van de vrouwen heeft herhaaldelijke blaasontstekingen. Risicofactoren geassocieerd met blaasontstekingen zijn: geslachtsgemeenschap, diabetes, catheterisatie, zwangerschap, gebruik van antibiotica, de menopauze en een eerder voorkomen van blaasontsteking.

Symptomen die gepaard gaan met een blaasontsteking zijn: pijn tijdens het urineren, een verhoogde frequentie van urineren, troebele urine en bloed in de urine. In het geval van bloed in de urine neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.

### Wat is de oorzaak van blaasontsteking?

De *Escherichia coli* bacteriën veroorzaken bijna 80% van alle infecties van de urinewegen waaronder blaasontsteking. Roter Cystiberry® behandelt en voorkomt een blaasontsteking die het gevolg is van een ontsteking door deze bacteriën.

### Hoe werkt het medisch hulpmiddel Roter Cystiberry®?

Roter Cystiberry® behandelt en voorkomt blaasontsteking door de hechting van de bacterie aan de blaaswand te verhinderen. Bacteriën moeten zich nestelen voordat ze kunnen vermenigvuldigen. Cranberry-Active™ is het actieve bestanddeel van Roter Cystiberry® die bacteriële aanhechting verhindert aan de blaaswand. Door het verhinderen van de aanhechting wordt een blaasontsteking voorkomen. Bij de behandeling van een blaasontsteking zorgt Cranberry-Active™ ervoor dat de bacteriën zich na vermenigvuldiging niet opnieuw kunnen hechten aan de blaaswand.

Roter Cystiberry® is een medisch hulpmiddel bestemd voor de behandeling en preventie van een blaasontsteking. Roter Cystiberry® bevat een gepatenteerd, hoog geconcentreerd compleet cranberry-extract genaamd Cranberry-Active™.

### Gebruiksaanwijzing

**Voor de behandeling van blaasontsteking:** neem 2 capsules per dag gedurende een periode van 15 dagen.

**Voor het voorkomen van blaasontsteking:** neem 1 capsule per dag gedurende een periode van 30 dagen.

### Waarschuwingen

Gebruik Roter Cystiberry® niet als u overgevoelig of allergisch bent voor vaccinium soorten (cranberries en blauwe bessen).

Gebruik Roter Cystiberry® niet meer na de vervaldatum vermeld op de blister en op de verpakking.



# CYSTIBERRY<sup>®</sup>

## GEBRUIKSAANWIJZING

Als de symptomen van een blaasontsteking niet verbeteren binnen 5 dagen van de behandeling, neem dan contact op met uw huisarts.

Als de symptomen die gepaard gaan met een blaasontsteking toenemen (bijv. koorts) neem dan contact op met uw huisarts.

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uitsluitend voor oraal gebruik.

### Vorzorgsmaatregelen

Roter Cystiberry<sup>®</sup> kan, voor zover bekend, gebruikt worden tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding indien het wordt gebruikt volgens de aanwijzingen en aanbevolen dosis. Het is echter aan te raden om uw huisarts te raadplegen voorafgaand aan het gebruik van Roter Cystiberry<sup>®</sup> tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Bij gebruik van warfarine wordt aanbevolen uw arts te raadplegen voor het gebruik van Roter Cystiberry<sup>®</sup>.

Voor zover bekend, kan Roter Cystiberry<sup>®</sup> gebruikt worden voor kinderen ouder dan 12 jaar.

Voor zover bekend, kan Roter Cystiberry<sup>®</sup> worden gebruikt in combinatie met geneesmiddelen. Neem in geval van twijfel contact op met uw huisarts of apotheker.

Voor zover bekend kan Roter Cystiberry<sup>®</sup> gebruikt worden door mensen die lijden aan diabetes.

### Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

### Inhoud verpakking

Blisterverpakking met 30 Cranberry-Active<sup>™</sup> capsules  
Doosje  
Gebruiksaanwijzing

### Bewaren

Bewaren op een veilige, droge en donkere plaats op kamertemperatuur (15° – 25°C).

Gebruik Roter Cystiberry<sup>®</sup> niet meer na de vervaldatum zoals vermeld op de blister en de verpakking.

### Ingrediënten

Cranberry-Active<sup>™</sup>, Amylum solani, hydroxypropylmethylcellulose (100%HPMC). Cranberry-Active<sup>™</sup> is een gepatenteerd extract (een concentraat) van cranberries.

### Distributeur

Imgroma BV, Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nederland

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

CE nummer 0481