

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

### **GAVISCON 250 PEPEERMUNT, KAUWTABLETTEN**

Natriumalginaat  
Natriumwaterstofcarbonaat  
Calciumcarbonaat

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Gaviscon 250 pepermunt en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. WAT IS GAVISCON 250 PEPEERMUNT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Dit middel vormt een beschermende laag die op de maaginhoud drijft. Deze laag voorkomt het terugvloeien van maagzuur naar de slokdarm en verlicht dus het brandende gevoel van brandend maagzuur en het gevoel van ongemak in de keel en mond. Brandend maagzuur kan optreden na de maaltijden (bijvoorbeeld bij het eten van vet of pikant voedsel), tijdens de zwangerschap of bij patiënten met verschijnselen die verband houden met een ontsteking in de wand van de slokdarm (bijvoorbeeld moeilijk en/of pijnlijk slikken, pijnlijke mond, braken).

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van gastro-oesofageale reflux zoals zure oprispingen, zuurbranden, maagklachten (gerelateerd aan reflux), bijvoorbeeld, na een maaltijd of tijdens de zwangerschap, en bij patiënten met verschijnselen gerelateerd aan een slokdarmontsteking.

### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- Als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- Als u bent geadviseerd om een natrium- of calciumbeperkt dieet te volgen, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt, aangezien dit medicijn natrium (5,3 mmol bij een dosering met 2 tabletten) en calcium (1,6 mmol bij een dosering met 2 tabletten) bevat.
- Als u een nier- of hartaandoening heeft of heeft gehad. Bespreek dan met uw arts het zout dat in dit

middel zit. Bepaalde zouten kunnen namelijk voor problemen zorgen bij deze aandoeningen.

Als de klachten niet weg zijn na 7 dagen, raadpleeg dan uw arts.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel inneemt.

Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

U mag dit middel gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

### **Gaviscon 250 pepermunt bevat aspartaam**

Als u fenylketonurie heeft (een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij het aminozuur fenylalanine onvoldoende wordt omgezet), houdt er dan rekening mee dat het product gezoet is met aspartaam, een bron van fenylalanine.

## **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Voor oraal gebruik. De tabletten moet u goed kauwen.

Gebruik bij volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 12 jaar: Als verschijnselen zich voordoen, neem dan twee tot vier tabletten na de maaltijd en voor het naar bed gaan, tot maximaal vier keer per dag.

### **Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar**

Mag uitsluitend op medisch advies worden gegeven.

### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Indien u teveel van dit middel heeft gebruikt, kunt u last hebben van een opgeblazen gevoel. Het is vrij onwaarschijnlijk dat u hier last van heeft, maar neem wel contact op met uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg uw arts en stop met het innemen van dit middel als u last krijgt van de volgende bijwerking:

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers) kan er een allergische reactie op een van de bestanddelen ontstaan. Mogelijke klachten die dan kunnen optreden zijn huiduitslag, jeuk, moeite met ademen, duizeligheid en zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden

via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

## 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

### Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn:

Natriumalgiinaat	250 mg
Natriumwaterstofcarbonaat	133,5 mg
Calciumcarbonaat	80 mg.

- De andere stoffen in dit middel zijn:

Mannitol (E421), macrogol 20.000, copovidon, aspartaam (E951), pepermuntsmak, magnesiumstearaat en acesulfaam-K.

Deze tabletten bevatten geen suiker of gluten.

### Hoe zien Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten eruit en hoeveel zitten er in een verpakking?

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten zijn ronde, licht gevlekte tabletten met een gebroken witte tot crème kleur.

Gaviscon 250 pepermunt kauwtabletten kunnen verkrijgbaar zijn in verpakkingen van 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 of 64 tabletten in blisterverpakkingen of 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2x16, 2x18, 2x20, 2x22 of 2x24 tabletten in polypropyleen verpakkingen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.

Siriusdreef 14

2132 WT Hoofddorp

Nederland

*Fabrikant*

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS,

Verenigd Koninkrijk

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nederland

### In het register ingeschreven onder:

RVG 31437 Gaviscon 250 pepermunt, kauwtabletten 250 mg

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

België (BE) en Luxemburg (LU)	Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten/ Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comprimé à croquer
Bulgarije	Gaviscon Peppermint Tablets 250mg/135.5mg/80mg chewable tablets, In local language (script)
Cyprus	Gaviscon Peppermint
Denemarken (DK)	Galieve Peppermint (tablets)
Duitsland	Gaviscon Pfefferminz 250mg/133,5mg/80mg Kautabletten
Finland	Galieve Peppermint Purutabletti
Franrijk (FR)	Gavisconell sans sucre menthe, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique
Griekenland	Gaviscon Peppermint Tablets
Hongarije	Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta (Gaviscon Peppermint Tablets)
Ierland (IE)	Gaviscon Peppermint Chewable Tablets
IJsland	Galieve Peppermint Tuggutoflur
Nederland	Gaviscon Peppermunt, kauwtabletten 250mg
Noorwegen	Galieve tyggetabletter med peppermuntesmak
Oostenrijk	Gaviscon Mint Kautabletten
Polen	Gaviscon o smaku mięty TAB
Portugal (PT)	Gaviscon
Roemenië	Gaviscon mentol comprimate masticabile
Slovenië	Gaviscon z okusom mentola 250mg/133,5mg/80mg zvecljive tablete
Slowakije	Gaviscon zuvacie tablety
Tsjechië	Gaviscon zvykaci tablety
Verenigd Koninkrijk	Gaviscon Peppermint Tablets
Zweden	Galieve Peppermint tuggtablett

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2019.**