



LOT:

2024-10 / 137AE

Plus de 100 ans d'expertise

Traitement Cors Verzorging van Likdoorns Pflege von Hühneraugen

Mode d'emploi: Appliquez sur des pieds propres et secs. Retirez le disque à l'aide d'un objet rigide de son support. Le placer et presser fermement sur le centre du cor. La partie adhésive orientée côté peau. Retirez le pansement protecteur du support et recouvrez le disque grâce à son adhésif testé dermatologiquement. Changez le pansement et le disque quotidiennement jusqu'à élimination du cor. Au cours de l'utilisation, la dissolution des cors par l'acide salicylique entraîne une décoloration de la peau.

Scholl et le diabète: Pour les personnes souffrant de diabète ou de troubles circulatoires veineux, ce produit peut présenter un risque. Ce produit ne peut être utilisé en cas de diabète ou de troubles circulatoires veineux ou de neuropathie diabétique. Consulter un docteur ou un podologue avant utilisation.

Attention. Ne pas utiliser dans les cas suivants: En cas de diabète, de troubles circulatoires veineux sévères ou de neuropathie. En cas de grossesse ou d'allaitement. En cas d'allergie connue à l'aspirine ou à tout autre ingrédient. En cas d'inflammation ou d'irritation de la zone autour du cor. Ne pas utiliser sur des cors mouls, entre les orteils. Ne pas utiliser si le cor saigne. Ne pas appliquer sur une peau saine. Ne pas utiliser plus de 2 semaines sans l'avis d'un professionnel de santé. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 16 ans. Arrêter l'utilisation et retirer le produit si une gêne ou une irritation apparaît et demander un avis médical. Si une irritation est apparue, demander un avis médical avant de réutiliser le produit. Arrêter l'utilisation et retirer le produit si le cor commence à saigner au cours de l'utilisation et demander un avis médical. Si d'autres effets secondaires apparaissent, consulter un professionnel de santé. En cas de réaction allergique, arrêter immédiatement l'utilisation.

Précautions: Pour usage externe uniquement. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

Rev. Number 03 (01/2021)
Composition des disques / Inhaltsstoffe / Zusammensetzung der Scheibe:
Salicylic Acid 40% w/w, Polyvinyl Alcohol, Titanium Dioxide, Liquid Paraffin, 1,4-bis-(2-tert-butyl-5-methylphenyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxide, Black Iron Oxide.
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Danson Lane, Hull, HU8 7DS UK
B.C. REP: PBI NL Brands B.V. Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, NL
Ceci est un dispositif médical. / Dit is een medisch hulpmiddel. / Dies ist ein medizinisches Gerät. Mfg. Lic. No. TNORUGSC006/1094

Verwendungsanweisung: Auf saubere, trockene Haut anwenden. Das Wirkstoffpflaster vom Trägerpapier abziehen. Mit der Klebseite zur Haut direkt auf das Hühnerauge kleben und fest anbrücken. Das Druckschutzpflaster darüber kleben und mit den Pflasterlappen feststücken dank seines dermatologisch getesteten Klebers. Wechseln Sie das Pflaster und die Scheibe täglich, bis das Hühnerauge entfernt werden kann. Während der Anwendung kommt es zu einer gewissen Verfärbung der Haut, da die Salicylsäure die Hühneraugen abbaut.

Scholl und Diabetes: Für Menschen mit Diabetes oder veinen Durchblutungsstörungen kann dieses Produkt ein Risiko darstellen. Dieses Produkt kann nicht in Fällen von Diabetes oder veinen Durchblutungsstörungen verwendet werden oder Neuropathie. Vor der Anwendung einen Arzt oder Fußpfleger konsultieren.

Achtung. In den folgenden Fällen nicht verwenden: Bei Diabetes, schweren veinen Durchblutungsstörungen oder Neuropathie. Im Falle einer Schwangerschaft oder Stillzeit. Im Falle einer bekannten Allergie gegen Aspirin oder einen anderen Inhaltsstoff. Wenn die Haut um das Hühnerauge herum entzündet oder gereizt ist. Nicht bei weichen Hühneraugen zwischen den Zehen verwenden. Nicht verwenden, wenn das Horn blutet. Nicht auf gesunde Haut auftragen. Länger als 2 Wochen ohne den Rat eines Arztes oder Apothekers. Nicht bei Personen unter 16 Jahren. Unterbrechen Sie die Anwendung und entfernen Sie das Produkt, wenn Beschwerden oder Reizungen auftreten, und suchen Sie ärztlichen Rat. Wenn eine Reizung aufgetreten ist, suchen Sie ärztlichen Rat, bevor Sie das Produkt wiederverwenden. Unterbrechen Sie den Gebrauch und entfernen Sie das Produkt, wenn das Horn während des Gebrauchs anfängt zu bluten, und suchen Sie ärztlichen Rat. Wenn andere Nebenwirkungen auftreten, konsultieren Sie einen Fachmann des Gesundheitswesens. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, die Anwendung sofort absetzen.

Warnungen: Nur zur Äußeren Anwendung. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung des Kartons beschädigt ist. Nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Gebruiksaanwijzing: Aanbrengen op schone en droge voeten. Haal het schijfje met salicylzuur van zijn drager. Plaats het schijfje op het centrum van de likdoorn, met het klevende gedeelte op de huid, en druk stevig aan. Bevestig het schijfje met de beschermende pleister die is voorzien van een dermatologisch getest kleefmiddel. Verwissel de pleister en de schijf dagelijks tot de likdoorn verwijderd kan worden. Tijdens het gebruik veroorzaakt het oplossen van likdoorns door salicylzuur verkleuring van de huid.

Scholl en diabetes: Voor mensen met diabetes of slechte circulatie kan dit product een risico vormen. Dit product kan niet worden gebruikt in geval van diabetes, slechte doorbloeding of zenuwbeschadiging. Raadpleeg voor gebruik een arts of chiropist.

Opgelet. Niet gebruiken in de volgende gevallen: In geval van diabetes, ernstige problemen met de bloedsomloop of zenuwbeschadiging. In geval van zwangerschap of borstvoeding. In geval van allergie voor aspirine of een van de andere ingrediënten. In geval van ontsteking of irritatie van de zone rond de likdoorn. Niet gebruiken op zachte likdoorns tussen de tenen. Niet gebruiken als de likdoorn bloedt. Niet aanbrengen op gezonde huid. Niet langer dan 2 weken gebruiken zonder advies van een zorgprofessional. Niet gebruiken bij personen van onder de 16 jaar. Stop met het gebruik en verwijder het product als er roosbouw of irritatie optreedt en vraag medisch advies. Als er irritatie is opgetreden, dient u een arts te raadplegen voordat u het product opnieuw gebruikt. Stop het gebruik en verwijder het product als de likdoorn begint te bloeden tijdens het gebruik en vraag medisch advies. Als er andere bijwerkingen optreden, raadpleeg dan een gezondheidsprofessional. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Waarschuwingen: Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Niet bewaren bij temperaturen van meer dan 25°C. Droog bewaren, beschermen tegen direct zonlicht. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Niet gebruiken na de vervaldatum die wordt vermeld op de verpakking.



CE 2460

Fabriqué en Inde
Gemaakt in India
in Indien hergestellt

3152574

Vertical text on the right edge of the box, including product details and contact information.