

Dosering en gebruiksaanwijzing

Neem het product uit de verpakking in ogenschouw voor:

Los de inhoud van 1 sachet op in 200 ml afgekoude (20-25°C) onschepbare vloeistof.
Gebruik steeds water van goede kwaliteit. Bij het koken, u het water beter eerst koken en het gekookte water laten afkoelen. Los het poeder in uille vloeistof door te roeren.
Gebruik het product volgens het gegeven voorschrift en bewaard het de houder houder niet.

Zuigelingen en kinderen tot 20 kg

Geef zuigelingen en kinderen 0,025-0,25 kg bloed 10-20 ml oplossing per kilogram lichaamsgewicht per uur; acht tot negen keer.
Kinderen van 3 kg krijgen dus 50-100 ml oplossing van 10 kg tot 100-200 ml.
Geef de O.P.S. oplossing aan zuigelingen niet bereid met 1 oplossing.
Meng het poeder van de sachet niet met de oplossing.

Volwassenen en kinderen vanaf 20 kg:

200 ml van de oplossing moet elke 2 uur u worden gegeven.

De oplossing kan warm worden met een elektrische verwarming.

Bij intensief sporten of zware lichamelijke inspanning:

Los de inhoud van 1 sachet op in 200 ml berouwen water.
Drink voor het sporten een ruime hoeveelheid water. Drink tijdens het sporten steeds kleine hoeveelheden van de oplossing; drink ieder half uur ca. 200 ml van de oplossing.

Waarachuwelingen:

Gebruik dit product niet bij een wat gheen verdund in de uitbreiding of bij versimpeling van het maag-darmkanaal en neermerkt, a. e. h. l. of andere de n. e. r. e. t.
Het product bevat glucose en dextrose; het is een zeer zwaar middel. Het product bevat natrium, houd het er rekening als u een natrium-arm dieet volgt.

Bij klachten, raadpleeg uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

U kunt dit product gebruiken in de zwangerschap en in de periode na de borstvoeding geeft.

Bewaren en houdbaarheid

De sachets zijn houdbaar bij bewaren in de originele verpakking en bij een temperatuur beneden 30°C tot de op de verpakking aangegeven datum.
Na het oplossen van de oplossing is de oplossing maximaal 24 uur houdbaar mits u de oplossing in de koelkast bewaart (2-8°C).
Bewaak het product buiten het bereik en zicht van kinderen.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen/Voor inlichtingen

Labo Sp. v. m. B.V.
A. v. m. de Boerweg 2
2283 CH Londen

LEIDAPHARM O.R.S.

Oral Rehydration Salt

Leidapharm O.R.S. is een oraal geneesmiddel, ter oplossing, en bevat zouten die een gunstige osmotische werking en gezonde leveractiviteit betreffen. Een verzorgingsplan moet niet als vervanging worden gebruikt.

Informatie voor de gebruiker

Lees voor gebruik de informatie over productinformatie goed door.

Als u nog vragen heeft over dit product of het gebruik ervan, neem dan contact op met uw arts, uw apotheker of uw huisarts.

Samenstelling

Leidapharm O.R.S. is een mengsel van zouten en van glucose.

Ingrediënten: 2,78 gram glucose, 0,98 mg natriumchloride, 310 mg natriumhydrogencarbonaat, 282 mg kaliumchloride, en 1,50 gram natriumzout van citroenzuur (E500) en 0,50 gram natriumzout van ascorbinezuur (E300).

De inhoudsoplossing (1 sachet per 200 ml water) bevat (per 200 ml):

15,5 mmol glucose, 12 mmol natrium, 4 mmol kalium (als 5% NaCl), 8,5 mmol chlooride (als 42% NaCl) en 2,2 mmol citraat.

NaCl – aantoonbaar laagijzer toevoeging.

De verpakking bevat 10 sachets met poeder.

2,4 sachet bevat 4,2 gram. Het is neto 100 gram 42 gram.

Toepassing

De inhoud van een sachet wordt opgelost in water.

De oplossing wordt toegepast:

- bij intensief sporten of zware lichamelijke inspanning

Leidapharm O.R.S. omzetsappelmak kan worden gebruikt worden door de kinderen die een kinders en zij krijgen.

Zij heeft het gebruik van Leidapharm O.R.S. normaal en drinken. Zorg dat u voldoende bijhouden.