

Exil No Worm CF
Pasta tegen wormen voor hond en kat

DIERGENEESMIDDEL
Reg. NL 7997 VRIJ

SAMENSTELLING PER ML

Niclosamide: 240 mg, Oxibendazole: 30 mg

DOELDIER
Honden en katten van alle leeftijden.
INDICATIE

Infecties bij de honden en katten van alle leeftijden met:

- Spoelwormen: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*.
- Lintwormen: *Dipylidium* spp. en *Taenia* spp.
- Zweepwormen: *Trichuris vulpis*.
- Haakwormen: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*.

GEBRUIKSAANWIJZING

1 ml pasta per 2 kg lichaamsgewicht in een eenmalige dosering achter op de tong spuiten.
De benodigde hoeveelheid kan ook door het voer gemengd worden.

DOSERING

Injector 5 ml: 1 doseerstreep is voor 0,5 kg hond/kat
Injector 10 ml: 1 doseerstreep is voor 2,0 kg hond/kat
Injector 25 ml: 1 doseerstreep is voor 10 kg hond/kat

BIJWERKINGEN

Bijwerkingen komen zelden voor.

WAARSCHUWINGEN

Drachtige dieren niet ontwormen. In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe (huishoud)handschoenen. In verband met het risico van uitspugen/braken kort na de toediening, dient vermeden te worden dat dit kan gebeuren op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen met uitsluitend schoon water zonder reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot de op de verpakking aangegeven expiratiedatum. Droog, bij kamertemperatuur (15-25 °C) en buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

VERPAKKING

Injector 5 ml in doosje

Injector 10 ml in doosje

Injector 25 ml in doosje

Informatie voor de huisdierbezitter

Deze bijsluiter wordt regelmatig aan de nieuwste farmacotherapeutische inzichten aangepast. U dient daarom de aanwijzingen goed te lezen, voordat u uw huisdier behandelt. De meest recente gebruiksinformatie vindt u op www.emax.nl.

Barneveld, maart 2010

A. Bos, dierenarts

Lees voor gebruik de bijsluiter.

REGISTRATIEHOUDER: Bridgefarma B.V.

PRODUCENT: Alfamed, France

Exil Diergeneesmiddelen

Divisie van Emax Nederland BV

Postbus 365, 3770 AJ Barneveld

Huisdier Informatie Centrum:

Tel 0900 2000 888 (€0,20/min)

www.emax.nl

(pagina 2)

ALGEMEEN WORMADVIES

Behandeladvies hond

- Pups : ontwormen op een leeftijd van 2, 4, 6, 8 weken daarna op 3, 4, 5, 6 maanden vervolgens 4x per jaar
- Volwassen dieren : minstens 4 x per jaar ontwormen
- Zogende teven : 2 en 4 weken na het werpen; vervolgens minstens 4x per jaar
- Kennels : alle honden 4-6 x per jaar ontwormen

Behandeladvies kat

- Kittens: ontwormen op een leeftijd van 3, 5, 7, 9 weken daarna op 3, 4, 5, 6 maanden vervolgens 4x per jaar
 - Volwassen dieren : minstens 4 x per jaar ontwormen
 - Zogende poezen: 3 en 5 weken na het werpen; vervolgens minstens 4x per jaar
- Genoemde adviezen zijn in overeenstemming met de Europese ESCCAP richtlijnen.

WORMEN BIJ HOND EN KAT

Bij hond en kat zijn de twee belangrijkste wormsoorten spoelwormen en vlooienlintwormen, die als volgt te herkennen zijn:

- Spoelwormen : lange, ronde, dunne wormen
 - Lintwormen : (bewegende) witte eipakketjes in de ontlasting
- Voor een optimaal resultaat moet u spoelwormen en lintwormen verschillend aanpakken. In deze bijsluiter kunt u lezen hoe.

DE SPOELWORM

Hond en kat hebben hun eigen spoelworm. Spoelwormen zijn lang, rond en dun. Ze vormen vooral bij jonge dieren een probleem.

Wat u beslist moet weten over de spoelworm

Pups en kittens worden al in de baarmoeder en/of via de moedermelk besmet. Ook raakt een hond of kat besmet door het oplikken van eitjes, die overvloedig in de omgeving voorkomen.

Wat te doen bij een spoelworminfectie

Behandel al uw honden (en eventueel aanwezige katten) met een wormmiddel. Dieren jonger dan 1 jaar bij voorkeur ontwormen met Exil No Worm Plus. Herhaal dit na 3 weken.

DE VLOOIENLINTWORM

De vlooienlintworm (*Dipylidium caninum*) komt o.a. voor bij hond en kat. Deze lintworm wordt door vlooiën overgebracht. Een besmette hond is te herkennen aan de eipakketjes die in de ontlasting voorkomen. Ze zien er uit als (bewegende) witte rijstkorrels.

Wat u beslist moet weten over de vlooiënlintworm

Uw huisdier verspreidt de lintwormeitjes in uw huis. Deze eitjes worden opgegeten door de nakomelingen van de vlo (de vlooiënlarven), die óók in uw huis leven. Na enkele weken ontwikkelt de met lintworm besmette vlooiënlarf zich tot een besmette volwassen vlo. Deze besmette volwassen vlo springt op uw huisdier. Uw huisdier vangt deze vlo met zijn tanden en eet de vlo, met lintworm, op. In de darm van uw huisdier aangekomen groeit de jonge lintworm uit tot een volwassen lintworm. De cirkel is nu rond.

Dus:

Hond/kat met lintworm → lintwormei → gegeten door vlooiënlarf → besmette volwassen vlo → hond/kat eet vlo → hond/kat met lintworm. Deze lintworm wordt alleen door vlooiën (en luizen) overgebracht en niet door vliegen e.d.

Wat te doen bij een lintworminfectie

Behandel al uw honden en katten tegen de vlooiënlintworm met een daarvoor geschikt product van Exil.

Voorkom dat vlooiëneitjes en –larven uitgroeien tot volwassen vlooiën. Gebruik hiervoor Exil Flea Free omgevingspray en/of Exil Twinspot.

Bestrijd de vlooiën op uw huisdier. Exil heeft hiervoor een uitgebreid assortiment. Kies het product dat het beste bij uw huisdier past. Voor meer informatie over vlooiën en vlooiënbestrijding: vraag bij uw dierenspecialzaak naar de folder van Exil en kijk op www.emax.nl.

Behandel vervolgens uw huisdier na 3 weken nog een keer tegen lintwormen.