

NESTOSYL[®]

Samenstelling

Bevat per gram hydrofobe crème: pramocaiëhydrochloride 10 mg, zinkoxide 100 mg, benzalkoniumbromide 0,1 mg, en 8-hydroxychinoline 0,04 mg (als conserveermiddelen), wolvet, witte vaseline, arachide-olie, sojalecithine.

Eigenschappen

Pramocaiëhydrochloride werkt lokaal pijn- en jeukstillend. Zinkoxide heeft een dekkende, verkoelende en zwak adstringerende (= samentrekkende) werking. Samenvattend werkt Nestosyl pijn en jeukverlichtend.

Toepassing

Ter verlichting van plaatselijke kortdurende jeuk, insectenbeten en oppervlakkige schaaf- en snijwonden.

Niet toepassen bij

Overgevoeligheid voor pramocaine, een van de conserveermiddelen of andere bestanddelen van de basis.

Bijwerkingen

Contactallergie of irritatie door pramocaine, een van de conserveermiddelen of de overige bestanddelen kan voorkomen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Nestosyl is niet geschikt voor toepassingen op slijmvliezen. Langdurige toepassing op grote huidoppervlakken moet worden vermeden.

Bij grove overdosering bestaat de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen ten gevolge van absorptie van pramocaine. Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, uw arts raadplegen. De aangegeven dosering niet overschrijden.

30032000-7

Gebruik in de zwangerschap en tijdens borstvoeding

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te besturen

Beïnvloeding van deze functies valt niet te verwachten.

Dosering en wijze van gebruik

Op de beschadigde huid brengt men een dikke laag Nestosyl crème aan. Vervolgens wordt de betreffende plek -zo nodig- afgedekt met een verbandgaas of pleister. Deze behandeling wordt één- à tweemaal per dag herhaald. Bij plaatselijke kortdurende jeuk of insectenbeten brengt men enige malen per dag een dunne laag crème aan.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar Nestosyl bij kamertemperaturen (15° - 25° C), buiten het bereik van kinderen. Op deze wijze bewaard is Nestosyl houdbaar tot en met de datum die op de verpakking is aangegeven onder de woorden "Niet te gebruiken na:" en in de zoom van de tube onder de afkorting "Exp."

Handelsvormen

Nestosyl wordt geleverd in tubes van 15 en 30 gram.

In het register ingeschreven onder RVG 00591.

Datum laatste wijziging:
September 1990