

soreFix®

Vaarwel koortslip, hallo glimlach

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u SoreFix Prevent koortslip balsem toepast, ook als u dit product al eerder heeft gebruikt. De informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van nieuwe resultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Prevent Koortslip balsem voor het voorkomen van een koortslip

Dagelijks

SoreFix Prevent koortslip balsem kan dagelijks gebruikt worden. Het voorkomt een koortslip doordat het een fysieke barrière vormt die de lippen beschermt tegen invloeden van buitenaf (zie koortslip triggers in de blauwe balk). Daarnaast bevat SoreFix Prevent een UV-filter (SPF 30) waarmee koortslip uitbraken, veroorzaakt door UV-licht, voorkomen kunnen worden. De koortslip balsem is rijk aan natuurlijke oliën en vitamine E om de conditie van de lippen te verbeteren.

Dosering en gebruik

Ter voorkoming van een koortslip brengt u SoreFix Prevent koortslip balsem dagelijks 3 tot 6 maal aan op de gehele lip, wanneer u blootgesteld bent aan één van de triggers. Het wordt aanbevolen uw handen te wassen voor het aanbrengen van de balsem. Bij gebruik van lipstick wordt geadviseerd om SoreFix Prevent koortslip balsem minimaal 15 minuten van tevoren aan te brengen.

SoreFix Prevent koortslip balsem is vrij van sulfaten, vrije polyethyleen glycolen, TEA's, DEA's, parabenen en andere conserveringsmiddelen.


Waarschuwingen voor gebruik

- SoreFix Prevent koortslip balsem is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik op en rond de lippen.
- Gebruik SoreFix Prevent koortslip balsem niet in geval van overgevoeligheid voor één of meer van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik wanneer SoreFix Prevent koortslip balsem irritatie of een allergische reactie veroorzaakt. Indien de symptomen aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts.
- Gebruik SoreFix Prevent koortslip balsem tijdens de zwangerschap alleen na aanbeveling en onder begeleiding van een arts. SoreFix Prevent koortslip balsem kan tijdens borstvoeding worden gebruikt.
- SoreFix Prevent koortslip balsem is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.

Bijwerkingen

SoreFix Prevent koortslip balsem wordt over het algemeen goed verdragen.

WAT DOET SOREFIX IN ALLE FASES VAN EEN KOORTSLIP?



Ingrediënten

Simmondsia chinensis (Jojoba) zaadolie, PEG-8 bijenwas, Ethylhexyl methoxycinnamaat, Octocryleen, Ethyleen/propyleen/styreen copolymeer, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoaat, Zinkoxide, Zinkricinoleaat, Parfum, Zetmeel-aluminiumoctenylsuccinaat, Tocoferylacetaat (vitamine E), Butyrospermum parkii (sheaboter), Butyleen/ethyleen/propyleen copolymeer, Punica granatum (granaatappel) zaadolie, Tri-ethoxycaprylylsilaan, BHT.

Ga voor meer informatie naar www.sorefix.nl

Lot nummer en vervaldatum: zie doosje en potje.

Medisch hulpmiddel:
SoreFix® Prevent koortslip balsem is een gecertificeerd Klasse IIa medisch hulpmiddel.

Buiten bereik van kinderen houden. SoreFix Prevent koortslip balsem kan tot 12 maanden na opening gebruikt worden.

Laatste update gebruiksaanwijzing: juni 2019

Koortslip behandelen

Om een koortslip te behandelen kunt u SoreFix Rescue koortslipcrème gebruiken. SoreFix Rescue koortslipcrème is een transparante crème met een bewezen effectiviteit in alle 4 de fases van een koortslip. SoreFix Rescue koortslipcrème verlicht de tinteling, vermindert de lipblaasjes, verkort de duur van de uitbraak en voorkomt het breken van de korstjes.



Serrix BV
Herengracht 458,
1017 CA, Amsterdam,
Nederland



L014NL107