



Dosering:

Zuigelingen en peuters (tot 2 jaar): 1 verstuiving in ieder neusgat naar behoefte.

Volwassenen en kinderen (ouder dan 2 jaar): 1 tot 2 verstuivingen in ieder neusgat naar behoefte.

De gebruikelijke frequentie is: 2-4 maal per dag per neusgat.

Geschikt voor zuigelingen, kinderen en volwassenen.

Win medisch advies in alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken.

Voor kinderen jonger dan 11 jaar moet Otrivin Baby Zoutoplossing worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.

Voor ouderen of personen met een beperking kan bij het gebruik van het hulpmiddel de hulp van een volwassene vereist zijn.

Ingrediëntenlijst: 0,74% natriumchloride, macrogol glycerol hydroxystearaat, benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat watervrij en gezuiverd water.

 GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz 1260 Nyon, Zwitserland




 0800 4090005

 nl.consumer-relations@gsk.com

 www.otrivin.nl

Handelsmerken in eigendom van of in licentie van GSK.

©2019 GSK-bedrijfsgroep of licentiegever.



15 ml

Medisch hulpmiddel