

PERIO·AID®

ACTIVE CONTROL

0,05% CHLORHEXIDINE + 0,05% CPC

NL.

Mondspoelmiddel

0,05% CHLOORHEXIDINE DIGLUCONAAT
+ 0,05% CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE

Raadpleeg voor het gebruik de bijsluiter. Buiten bereik van kinderen houden. Niet doorslikken. Niet in het zonlicht bewaren. Te gebruiken voor: zie datum op verpakking.

FR.

0,05% DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE
+ 0,05% CHLORURE DE CÉTYLPYRIDINIUM

Consulter la notice pour les conditions d'utilisation. Garder hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas exposer à la lumière solaire directe. À utiliser avant le: voir emballage.

IT.

0,05% CLOREXIDINA DIGLUCONATO
+ 0,05% CETILPIRIDINIO CLORURO

Vedere il foglietto illustrativo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non esporre a luce solare diretta. Da consumarsi entro: Vedere la confezione.

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Methylparaben, Chlorhexidine Digluconate, Cetylpyridinium Chloride, Potassium Acesulfame, Ethylparaben, Sodium Saccharin, Neohesperidin Dihydrochalcone, Aroma, C.I. 42051.

32086



500 ml

DENTAID

Made by: DENTAID, S.L. - 08290 Cerdanyola (Spain)
Distributed in the EU by: visit www.dentaid.com

MONDSPOELMIDDEL
ZONDER ALCOHOL

PERIO·AID[®]
ACTIVE CONTROL

0,05% CHLOORHEXIDINE
+ 0,05% CPC

ACTIEVE CONTROLE VAN DE ORALE BIOFILM
GESCHIKT VOOR LANGDURIG GEBRUIK

Mondspoelmiddel

DENTAID

8 427426 042087
CNK 3430-535



LOT T1009

EXP 02 2025

PERIO·AID[®]

ACTIVE CONTROL

**0,05% CHLORHEXIDINE
+ 0,05% CPC**

PERIO-AID

ACTIVE CONTROL

0,05% CHLOORHEXIDINE + 0,05% CPC

NL

SAMENSTELLING

Chloorhexidine digluconaat 0,05%
Cetylpyridinium chloride 0,05%

INDICATIES

- Na tandheelkundige behandelingen
- Bij overmatige tandplaquevorming (orale biofilm)
- Wanneer een goede mondhygiëne moeilijk is te onderhouden

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Twee keer per dag spoelen met 15 ml gedurende 30 seconden, 's ochtends en 's avonds na het tandenpoetsen. NIET DOORSLIKKEN.
- Niet met water naspoelen en niet eten of drinken tot een half uur na het gebruik van Perio-Aid Active Control Mondspoelmiddel.
- De meeste tandpasta's bevatten anionische bestanddelen die de effectiviteit van chloorhexidine verminderen. Na het gebruik van deze tandpasta's, maar voor het gebruik van Perio-Aid Active Control Mondspoelmiddel, is het raadzaam om de mond 3 keer met veel water te spoelen. Perio-Aid Intensive Care Gel bevat geen anionische bestanddelen waardoor het zeer goed te gebruiken is in combinatie met Perio-Aid Active Control.

BIJWERKINGEN

- Een verandering van smaakperceptie kan in sommige gevallen optreden, irritatie van de tong komt zeer incidenteel voor. Beide effecten verminderen wanneer het gebruik van het product gecontinueerd wordt.
- Dit product bevat de stof Chloorhexidine, een bestanddeel dat de tanden, kiezen en tong tijdelijk kan verkleuren. Deze verkleuringen treden in de regel op na langdurig gebruik en wanneer tijdens de periode van gebruik tevens bepaalde dranken en voedingswaren worden gebruikt zoals rode wijn, koffie, thee en tabak.
- Deze verkleuringen zijn niet permanent en kunnen voor een groot deel worden voorkomen door een goede mondhygiëne. Poets de tanden zorgvuldig en reinig ook tussen de tanden met interdentale hulpmiddelen (ragers) voorafgaand aan het spoelen met het mondspoelmiddel. Mocht dat niet effectief genoeg zijn dan kan een tandarts of mondhygiënist de aanslag verwijderen.

PRODUCTEN

PERIO-AID Intensive Care

0,12% Chloorhexidine + 0,05% CPC

- Mondspoelmiddel 500 ml
- Mondspray 50 ml

PERIO-AID Intensive Care 0,12% Chloorhexidine

- Gel om mee te poetsen of lokaal aan te brengen 75 ml

Alleen met gebruik van kinderen houden. Niet in het zonlicht bewaren.
Bij gebruik in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

MONDSPOELMIDDEL ZONDER ALCOHOL

ACTIEVE CONTROLE VAN DE
ORALE BIOFILM
GESCHIKT VOOR
LANGDURIG GEBRUIK

PER

ACTIVE CO

0,05% CHLOORHEXIDINE

FR

COMPOSITION

Digluconate de chlorhexidine
Chlorure de Cetylpyridinium C

INDICATIONS

- Après les soins dentaires
- En cas d'accumulation excess
- Quand il est difficile de conse

MODE D'EMPLOI

- 1 rinçage (15ml) pendant 30 s
- AVALER.
- Après usage, ne pas rincer la
- La plupart des dentifrices c
- chlorhexidine. Après avoir
- Control Bain de bouche, l
- Gel Perio-Aid Intensive C
- l'utiliser en combinaison

EFFETS SECONDAIRES

- Un changement de p
- langue dans de très r
- Ce produit contient de
- de la faible concentrat
- après une utilisation pro
- consommation de tabac.
- Ces colorations ne sont p
- bonne hygiène bucco-den
- interdentaires à l'aide d'un
- méthode n'est pas assez effi

GAMME

PERIO-AID Intensive Care

0,12% Chloorhexidine + 0

- Flacon de 150 ml
- Flacon de 500 ml
- Spray 50 ml

PERIO-AID Intensive

0,12% Chloorhexidin

- Gel dentifrice pour l

Garder hors de port
Ne pas utiliser en