

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Otagan zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze flesstelt, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Meld bij een arts alvorens de verschijnselen versagen of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Otagan en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Otagan gebruikt.
3. Hoe wordt Otagan gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe hoort u Otagan?

OTALGAN oordruppels, oplossing 5 mg/g Lidocainehydrochloride

- Het werkzame bestanddeel van Otagan, oordruppels, is lidocainehydrochloride, 5 mg/g.
- Het andere bestanddeel (hulpstof) is glycerol.

1. Wat is Otagan en waarvoor wordt het gebruikt?

Naam van het geneesmiddel

Otagan, oordruppels

Samenstelling

Otagan oordruppels bevatten als werkzaam bestanddeel lidocainehydrochloride (5 mg/g), en glycerol als hulpstof. 1 ml omvat ongeveer 28 druppels; per ml bevat Otagan 60 mg lidocainehydrochloride.

Farmaceutische vorm en inhoud

Compuvas (oplossing), 1 flesje bevat 12 gram oplossing.

Geneesmiddelen groep

Lidocainehydrochloride is een lokaal werkende pijnstiller middel.

Waarvoor wordt Otagan gebruikt?

Otagan wordt gebruikt bij oorpijn.

2. Wat u moet weten voordat u Otagan gebruikt.

Gebruik Otagan niet wanneer u een loopoor of trommelvliesperforatie heeft of hebt gehad, of overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het product.

Wees extra voorzichtig met Otagan indien er koorts optreedt, of de behandeling niet binnen 2 weken tot resultaat leidt, raadpleeg u dan uw arts.

Zwangerschap

Otagan kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overdraagbaar of voortdurend worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker evenwel om advies voordat u Otagan gebruikt.

Borstvoeding

Bij gebruik van Otagan is geen voorzichtsmaatregel tijdens het geven van borstvoeding te nemen of geen risico aanwezig voor het kind. Vraag uw arts of apotheker evenwel om advies voordat u Otagan gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat het gebruik van Otalgan volgens het voorschrift een effect heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van Otalgan in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn van Otalgan geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt Otalgan gebruikt?

Naar gelang de leeftijd van 3-5 druppels in de gehoorgang brengen met tussenpozen van 2-4 uur. Breng vóór toediening het middel op lichaamstemperatuur.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zelfs alle geneesmiddelen kan Otalgan bijwerkingen veroorzaken.

Bij het gebruik van Otalgan kunnen soms overgevoeligheidsreacties optreden.

In geval of bij u een bijwerking opvalt die niet in deze bijsluiter is vermeld,

of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Otalgan?

Otalgan buiten bereik en zicht van kinderen houden. Niet boven 25°C bewaren in de originele omverpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Otalgan niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld onder "niet te gebruiken na". Na opening is Otalgan nog 1 jaar houdbaar.



Zelfzorg.nl

Registratienummer:

Vitor France SA, 123, rue des Guezes F-92300 Lavallois -Arrol, Frankrijk

In het register ingeschreven onder FVG 00334.

Deze bijsluiter is voor het eerst gezien in April 2008.

Voor meer informatie:

bel Vemaris N.V. (0800) 2322 666 (€ 0,15/min.)

NL0206

NL 7.04 003