EN Instructions of use: Handle the condom carefully, including removal from the package so as to avoid damage to the condom by fingernails, jewellery etc. The condom should be placed on the erect penis before any contact occurs between the penis and the partner's body to assist in the prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. Hold the reservoir between thumb and forefinger and remove any air remaining in the tip of the condom by squeezing it between thumb and forefinger. Unroll the condom over the penis. Stop and check if you feel the condom slipping off or tightening excessively as this the penis because this might lead to breakage. Perhaps you have to choose another condom size. Withdraw the penis soon after ejaculation, while holding the condom firmly in place at the base of the penis. If an additional lubricant is desired, use the correct type of lubricant which is recommended for use with condoms and avoid the use of oil-based lubricants, such as petroleum jelly, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc., as these are detrimental to the integrity of the condom. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom. Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 h, should a condom leak or burst during use. If the individual condom blister is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an undamaged package. Dispose the condom as a waste bin. Do not flush down the toilet. The condom is for single use only and if reused there might be an increased risk of failure or infection. The condom is made of natural rubber latex, which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user is allergic to latex. No contraceptive can guarantee 100% protection.

DE Gebrauchsanweisung: Das Kondom sollten bei der Entnahme aus der Verpackung vorsichtig behandelt werden, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden. Das Kondom muss vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners über den erigierten Penis gestreift werden, um bei der Verhütung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken zu können. Halten Sie das Reservoir an der Spitze des Kondoms, so dass zwischen Daumen und Zeigefinger, dann dort kein Luftgemisch entsteht. Rollen Sie das Kondom über den Penis aus. Falls Sie spüren, dass das Kondom abrutscht oder zusammenzieht, auf dem Penis spannt, unterbrechen Sie und überprüfen Sie das Kondom, da dies zu einem Riss führen kann. Eventuell müssen Sie eine andere Kondomgröße wählen. Ziehen Sie den Penis bald nach der Ejakulation heraus, während das Kondom am Penisansatz festzuhalten ist. Bei Verwendung eines zusätzlichen Gleitmittels ist es erforderlich, nur solche zu verwenden, die für das Gebrauch mit Kondomen als geeignet ausgewiesen sind. Sie Anwendung folgender Gleitmittel wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöle, Butter, Margarine usw. ist zu vermeiden, da diese die Unversehrtheit des Kondoms beeinträchtigen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kontakt mit dem Kondom kommen können, ist es erforderlich, einen Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit zu konsultieren. Sollte ein Kondom während des Geschlechts undicht werden oder platzen, suchen Sie möglichst schnell medizinische Hilfe, spätestens innerhalb von 72 Stunden. Wenn die Einzelpackung Risse offensichtlich beschädigt ist, verwerfen Sie dieses Kondom und verwenden Sie ein neues aus einer unbeschädigten Packung. Entsorgen Sie das gebrauchte Kondom im Abfalleimer und nicht in der Toilette. Verwenden Sie das Kondom nur einmal, da wenn das Kondom wiederverwendet wird, ein erhöhtes Risiko für ein Versagen oder für eine Infektion vorliegen kann. Kondome sind aus Naturkautschuklatex hergestellt und können Allergien auslösen, einschließlich anaphylaktischen Schock, wenn Sie allergisch auf Latex reagieren. Kein Verhütungsmittel kann einen 100% Schutz garantieren.

ES Instrucciones de uso: Abra y retire el preservativo de su envoltura con cuidado para evitar o dañarlo con las uñas, joyas etc. Coloque el preservativo en la cabeza del pene erecto antes de que se produzca cualquier contacto con el cuerpo de su pareja para ayudar en la prevención en las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. Sujete el preservativo por el depósito en la punta sobre los dedos pulgar e índice para evitar que se forme aire burbuja de aire al rodarlo. Desenrolle el preservativo a lo largo del pene hasta llegar a la base. Si siente que el preservativo se resbala o se aprieta excesivamente, detengase y compruebe porque podría romperse. Puede ser que requiera una talla mayor o menor del preservativo. Después de eyacular retire el pene pronto, sosteniga el preservativo firmes en la base. Si desea usar lubricantes adicionales se debe usar únicamente aquellos tipos correctos que son designados como aptos para el uso con preservativos. Es recomendo a evitar el uso de aceites a base de petróleo, tales como vaselina, aceite de bebe, lociones corporales, aceites de masaje, mantequilla, margarina o productos ya que estos afectan la integridad del preservativo. Si use medicamentos tópicos que podrían tener contacto con el preservativo, consulte a un médico o farmacéutico acerca de su compatibilidad con el preservativo. Si el preservativo muestra fugas o se rompe durante el uso, busque ayuda médica lo más pronto posible y dentro de los 72 horas. Si la envoltura clínica de aluminio del preservativo está deteriorada claramente, desechelo y use un preservativo con un empaque intacto. Tire el preservativo usado en la basura y no en el water. Use el preservativo una sola vez. Posiblemente de un mayor riesgo de fracaso o infección. Condones son hechos de látex de caucho natural y por lo tanto pueden causar reacciones alérgicas incluyendo un shock anafiláctico. Ningún dispositivo anticonceptivo puede garantizar una protección al 100%.

FR Mode d'emploi : Manipuler le préservatif avec précaution, y compris lorsque vous le retirez de son emballage, en sorte à éviter tout dommage causé par les ongles, les bijoux, etc. Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire pour favoriser la prévention de la transmission de maladies sexuellement transmissibles et pour éviter la survenue d'une grossesse. Tenir le réservoir entre le pouce et l'index et retirer l'air restant dans l'extrémité du préservatif en le pressant entre le pouce et l'index. Dérouler le préservatif sur le pénis. Arrêter et vérifier l'état du préservatif si celui-ci glisse ou adhère trop fortement au pénis étant donné que cela peut occasionner une rupture. Vous devrez peut-être choisir une autre taille de préservatif. Retirer le pénis immédiatement après éjaculation en maintenant fermement le préservatif en place à la base du pénis. Si un lubrifiant supplémentaire est souhaité, utilisez un type adapté au lubrifiant recommandé pour être utilisé avec des préservatifs et éviter l'utilisation de lubrifiants à base d'huile, comme la vaseline, l'huile pour bébé, les lotions pour le corps, les huiles de massage, le beurre, la margarine, etc. étant donné que ces produits peuvent compromettre l'intégrité du préservatif. Consultez un médecin ou un pharmacien pour connaître la compatibilité des médicaments topiques qui pourraient entrer en contact avec le préservatif. Veuillez prendre un avis médical dès que possible, au moins dans les 72 heures, si un préservatif fuit ou éclate pendant son utilisation. Si l'emballage individuel est manifestement endommagé, jetez un préservatif et utilisez-en un nouveau tel qu'il figure dans un emballage intact. Jeter le préservatif dans une poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes. Le préservatif est conçu exclusivement pour un usage unique, s'il est réutilisé, le risque de défaillance ou d'infection est accru. Ce préservatif est en latex de caoutchouc naturel ce qui peut engendrer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique, si l'utilisateur est allergique au latex. Aucun contraceptif ne peut garantir une protection totale.

IT Istruzioni per l'uso: prestare attenzione nel maneggiare il preservativo, anche quando lo si estrae dalla confezione, per evitare di danneggiarlo con unghie, gioielli, ecc. Applicare il preservativo sul pene eretto prima che questo entri in contatto con il corpo della partner per assistere nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e della gravidanza. Tenere il serbatoio tra il pollice e l'indice e stringerlo tra le dita per eliminare l'aria eventualmente rimasta nella punta del preservativo. Srotolare il preservativo lungo il pene. Fermarsi e controllare che il preservativo non scivoli facilmente o che non stringa eccessivamente il pene per evitare la possibilità di rottura. In questo caso si deve fare scegliere un preservativo di misura diversa. Sfilare il pene subito dopo l'eiaculazione, tenendo fermo il preservativo alla base del pene. Se si desidera utilizzare un lubrificante addizionale, scegliere il tipo corretto, raccomandato per l'uso con preservativi, evitare di utilizzare lubrificanti a base oleosa, come vaselina, olio per bambini, lozioni per il corpo, oli da massaggio, burro, margarina, ecc., poiché hanno effetti dannosi sul preservativo. Consultare il medico o il farmacista per la compatibilità con medicinali topici che potrebbero entrare in contatto con il preservativo. In presenza di perdite o se il preservativo si rompe durante l'uso, rivolgersi al più presto a un medico e almeno entro 72 ore. Se la confezione singola presenta evidenti segni di danno, smaltire il preservativo e utilizzarne uno nuovo in confezione integra. Smaltire il preservativo nel cestino dei rifiuti. Non gettarlo nel WC. Il preservativo è esclusivamente monouso: se riutilizzato si rischia di rottura o infezione possibile. Questo preservativo è in lattice di gomma naturale, che potrebbe provocare reazioni allergiche, compreso shock anafilattico se l'utilizzatore è allergico al lattice. Nessun contraccettivo può garantire una protezione del 100%.

SV Bruksanvisning: Hantera kondomen försiktigt, även när du tar ut den ur förpackningen, så att den inte skadas av naglar, smycken och liknande. Kondomen ska sättas på den erigerade penisen innan någon kontakt mellan partnern och penisen kropp sker. Det bidrar till att säkert skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet. Håll behållaren längst ut på kondomen mellan tummen och pekfingret och krama ut all luft som finns där genom att klämma kondomen mellan tummen och pekfingret. Rulla ut kondomen längs penisen. Pausa och kontrollera om det känns som att kondomen glider av eller sitter för hårt, eftersom det kan göra att den går sönder. Det kan hända att du behöver ta en annan kondomstorlek. Dra ut penisen så snart som möjligt efter utlösning, och håll kondomen på plats vid penisroten. Om det behövs ytterligare glidmedel bör du välja ett lämpligt glidmedel som rekommenderas för användning med kondomer. Undvik oljebaserade glidmedel som vaselin, babyolja, kroppslotioner, massageolja, smör, margarin osv, eftersom dessa kan skada kondomen. Fråga läkare eller apotekspersonal om kompatibilitet med eventuella olyckliga läkemedel som kan komma i kontakt med kondomen. Se till att du kontaktar din gynekolog så snart som möjligt, senast inom 72 timmar. Om en enskild kondomförpackning är synligt skadad, ska kondomen slängas. Använd istället en ny av en oskadad förpackning. Kasta kondomen i en papperskorg. Spola inte ned den i toaletten. Kondomen är endast för engångsbruk. Återanvändning kan innebära ökad risk för [illegible] och att den inte fungerar som den ska. Kondomen är tillverkad av naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock, om användaren är allergisk mot latex. Inget preventivmedel är 100 % effektivt.

NO Gebruksaanwijzing: Ga voorzichtig met het condoom om, waaronder bij het verwijderen van de verpakking, om beschadiging door nagels, sieraden enz. te voorkomen. Dit om zwangerschap of een verhoogd overdraagbare infecties te voorkomen moet het condoom over de erecte penis worden geplaatst voordat er enig contact optreedt tussen de penis en het lichaam van de partner. Houd het reservoir tussen duim en wijsvinger, om overtollige eventueel achtergebleven lucht in de punt van het condoom door de lip met duim en wijsvinger weg te drukken. Rol het condoom over de penis. Stop en controleer of u het condoom voelt afglijden of snelt dat het te strak om de penis zit, omdat dit tekken zou kunnen veroorzaken, in dit geval kan het nodig zijn een andere maat condoom te kiezen. Trek de penis uit snel na de ejaculatie terwijl terwijl u het condoom aan de basis van de penis stevig op zijn plaats houdt. Als er extra glijmiddel nodig is, gebruikt u het juiste soort glijmiddel dat aanbevolen wordt voor gebruik met condooms, en vermijdt u het gebruik van glijmiddelen op oliebasis, zoals vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, boter, margarine enz. omdat deze de integriteit van het condoom ernstig aantasten. Vraag een arts of apotheker of plaatselijke geneeskrachtige geneesmiddelen die mogelijk in contact komen met het condoom, schadelijk kunnen zijn voor het condoom. Zoek zo snel mogelijk medische hulp, maar in ieder geval binnen 72 uur, als een condoom lijkt te gaan lekken of scheuren tijdens gebruik. Als de individuele verpakking duidelijk beschadigd is, moet u dat condoom weggooien en een nieuwe gebruiken uit een onbeschadigde verpakking. Gooi het condoom weg in de vuilnisbak. Spoel het niet door het toilet. Het condoom is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en als het wordt hergebruikt, kan er een verhoogd risico op beschadiging of infectie optreden. Het condoom is gemaakt van natuurlijk rubberlatex dat bij allergische reacties kan leiden als de gebruiker allergisch is voor latex. Geen enkel anticonceptiemiddel kan 100% bescherming garanderen.

DA Brugsanvisning: Vær omhyggelig med behandlingen af kondomet, herunder ved udtagningen fra indpakningen, for at undgå beskadigelse af kondomet fra fingernegle, smykker osv. Kondomet skal anbringes på den erigerede penis inden kontakt mellem penis og partnerens krop for at hjælpe med forebyggelsen af seksuelt overførte sygdomme. Hold kondomet mellem tommel- og pegefinger, og fjern al luft i reservoirets spids ved at klemme det ud mellem tommel- og pegefinger. Rul kondomet ned over penis. Stop og kontrollér, om du føler kondomet glide af eller strammer for meget på penis, fordi dette kan føre til sprængning. Måske skal du vælge en anden kondomstørrelse. Træk penis tilbage straks efter udløsning, mens du holder kondomet sikkert på plads ved penisroden. Hvis du ønsker yderligere glidecreme, skal du anvende korrekt type glidecreme, som anbefalines til brug sammen med kondomer, og undgå brug af oliebaserede cremer, f.eks., vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, smør, margarine osv., da disse er uheldige for kondomets holdbarhed. Spørg en læge eller apotekspersonalet om foreningsforhold af udvortes lægemidler, der kan komme i kontakt med kondomet. Søg lægehjælp snarest muligt og senest efter 72 timer, såfremt et kondom bliver revet eller brister ved brug. Hvis den enkelte indpakning klart er beskadiget, skal det kondom kasseres og et nyt anvendes fra en ubeskadiget indpakning. Kortslut kondomet i en affaldsbeholder. Det må ikke skylles ud i toilettet. Kondomet er kun til engangsbrug. Ved det gentagelses, er der en forøget risiko for svigt eller infektion. Kondomet er fremstillet af naturlig gummilatex, som kan give allergiske reaktioner, herunder allergisk shock (anafylaktisk shock), hvis brugeren er allergisk over for latex. Ingen antikonceptiva kan garantere 100 % beskyttelse.

SV Bruksanvisning: Var försiktig när du använder kondomen, även när du tar ut den ur förpackningen, så att den inte skadas av naglar, smycken och liknande. Kondomen ska sättas på den erigerade penisen innan någon kontakt mellan partnern och penisen kropp sker. Det bidrar till säkert skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet. Håll behållaren längst ut på kondomen mellan tummen och pekfingret och krama ut all luft som finns där genom att klämma kondomen mellan tummen och pekfingret. Rulla ut kondomen längs penisen. Pausa och kontrollera om det känns som att kondomen glider av eller sitter för hårt, eftersom det kan göra att den går sönder. Det kan hända att du behöver ta en annan kondomstorlek. Dra ut penisen så snart som möjligt efter utlösning, medan du håller kondomet säkert på plats vid penisroten. Om du önskar ytterligare glidcreme, skall du använda korrekt typ av glidcreme, som rekommenderas till bruk tillsammans med kondomer, och undvik att använda oljebaserade glidmedel, som exempelvis vaselin, babyolja, kroppslotion, massageolja, smör, margarin osv., då dessa är skadliga för kondomens hållbarhet. Fråga en läkare eller apotekspersonalet om förenligheten av eventuella läkemedelen som kan komma i kontakt med kondomet. Sök läkarhjälp snarast möjligt och senast efter 72 timmar, såfremt ett kondom bliver revet eller brister ved brug. Hvis den enkelte indpakning klart er beskadiget, skal det kondom kasseres og et nyt anvendes fra en ubeskadiget indpakning. Kortslut kondomet i en affaldsbeholder. Det må ikke skylles ud i toilettet. Kondomet er kun til engangsbrug. Ved det gentagelses, er der en forøget risiko for svigt eller infektion. Kondomet er fremstillet af naturlig gummilatex, som kan give allergiske reaktioner, herunder allergisk shock (anafylaktisk shock), hvis brugeren er allergisk over for latex. Ingen antikonceptiva kan garantere 100 % beskyttelse.

PL Instrukcja użycia: Ostrożnie się przyzwyczaja się przy wyjmowaniu z opakowania, aby nie uszkodzić paznokciami, biżuterią i podobnymi. Prezerwatywę należy założyć na wzwiedziony penis przed kontaktem z ciałem partnerki, aby zapobiec przenoszeniu chorób przenoszonych drogą płciową oraz ciąży. Trzymając zbiornik między kciukiem a palcem wskazującym, wyciśnij powietrze z końcówki prezerwatywy. Rozwiń prezerwatywę na całej długości penisa. Przerwij i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się z penisa lub nie jest za ciasna, ponieważ może to spowodować jej pęknięcie. Może okazać się konieczne użycie innego rozmiaru prezerwatywy. Wyjmij penis zaraz po wytrysku, trzymając prezerwatywę u nasady penisa. Jeśli konieczne jest użycie dodatkowego środka poślizgowego, należy wybrać taki, który jest przeznaczony do użytku z prezerwatywami i unikać środków na bazie oleju, takich jak wazelina, olejek dla dzieci, balsamy do ciała, olejki do masażu, masło, margaryna itp., ponieważ mogą one uszkodzić prezerwatywę. Przed użyciem jakichkolwiek leków miejscowych, które mogą mieć kontakt z prezerwatywą, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, czy nie wpływają one negatywnie na prezerwatywę. W przypadku wycieku lub pęknięcia prezerwatywy podczas użytku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, najpóźniej w ciągu 72 godzin. W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania jednostkowego należy wyrzucić prezerwatywę i użyć nowej z nieuszkodzonego opakowania. Zużytą prezerwatywę należy wyrzucić do kosza na śmieci. Nie należy spuszczać jej w toalecie. Prezerwatywa jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może zwiększyć ryzyko pęknięcia lub zakażenia. Prezerwatywa jest wykonana z naturalnego lateksu kauczukowego, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, jeśli użytkownik jest uczulony na lateks. Żadna antykoncepcja nie zapewnia 100% ochrony.

CZ Návod k použití: Zacházejte s kondomem opatrně a nenoťte jej vyjímání vyjímejte z obalu, aby nedošlo k jeho poškození nehty, šperky, atd. Kondom je třeba nasadit na vztyčený penis, dříve jakýmkoli kontaktem s tělem partnerky či partnera pro pomoc k prevenci pohlavně přenosných infekcí a těhotenství. Držte rezervoár mezi palcem a ukazováčkem a odstraňte veškerý vzduch, zbylý při tom ve špičce kondomu stlačte mezi palcem a ukazováčkem. Vyrolujte kondom přes penis. Přestaňte a zkontrolujte, zda nemáte pocit, že kondom sklouzává nebo je na penisu příliš na těsno, protože by to mohlo vést k prasknutí. Je možné, že budete muset zvolit jinou velikost kondomu. Bezprostředně poté, co dojde k ejakulaci a přitom přidržujte penis, penis co nejdříve vytáhněte, a přitom přidržujte kondom u základny penisu. Pokud je použitelné mazání, použijte správný typ lubrikantu, doporučený pro použití s kondomy, a nepoužívejte lubrikanty na bázi oleje, jako je vazelína, dětský olej, tělová mléka, masážní oleje, másla, margarín, atd., protože by mohly narušit celistvost kondomu. Pro účely se s lékařem nebo lékárníkem ohledně kompatibility topických léčiv, která by mohla přijít do styčku s kondomem. Pokud je kondom během užití roztrhnut nebo praskne, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc, nejpozději do 72 hodin. Pokud je jednotlivý obal zjevně poškozen, kondom nepoužívejte a použijte nový z nepoškozeného balení. Odhoďte kondom do odpadkového koše. Nevyplachujte jej do toalety. Kondom je určen pouze k jednorázovému použití a při jeho opakovaném použití se může zvýšit možné riziko selhání nebo infekce. Kondom je vyroben z přírodního kaučuku, který může způsobovat alergické reakce včetně anafylaktického šoku, pokud je uživatel alergický na latex. Žádná antikoncepce nemůže zaručit 100% ochranu.

GR Инструкции по применению: С презервативом следует обращаться аккуратно, в том числе, извлекая его из упаковки, следует следить за тем, чтобы не повредить его ногтями, ювелирными украшениями и т. д. Во избежание инфекций, передаваемых половым путем, и нежелательной бере-

Manufactured for and distributed by:
RFA consumer goods GmbH, Wasserburger Landstraße 266, 81827 München, Germany
WWW.MY.SIZE.COM/MORE
Hartmann Rubber Technologies Sdn. Bhd.,
Plot 309, Kuala Kedi Industrial Estate,
09300 Kuala Kedi, Kedah, Malaysia.
Hergestellt und vertrieben von:
Manufactured for and distributed by:
Fabriqué pour et distribué par:
Fabbricato per e distribuito da:
Fabricado para y distribuido por:
Vervaardig vir en versprei deur:
Tillverkad för och distribuerad av:
Produsert for og distribuert av:
Vyrobeno pro a distribuováno:
Wyprodukowano dla i dystrybuowane przez:
Κατασκευάστηκε για και διανέμεται από:

MY.SIZE
PRO

AS UNIQUE AS YOU

CE 1639