

 Boehringer Ingelheim	AMT ING	PPM Code: 139623I-2602	
		SKU: 139491 / 139497 / 139623 / 139624	
Version:	3	Date:	14.04.2026
		Colors	
Product:	Canikur® Pro		Black
Component Type/Size:	Leaflet		T
Country(s):	Belgium / Netherlands		
Dimensions FLAT (HxWxD):	195 x 105 mm		
Dimensions FOLDED:	195 x 22 mm		
Scale/Font Size:	1:1		6.2 pt.
Spec/Dieline #:			
Manufacturer:	CMO ADM Protexin Limited		
		Finishing /Tech Info	
Cancel and Replace:	139623I-2404		
Printer Notes:			

Canikur® Pro



Pâte orale avec des ingrédients naturels

Aliment complémentaire pour le soutien de la flore intestinale naturelle des chiens et chats

Seringue de 15 ml ou 30 ml

Destiné aux animaux

Aliment complémentaire pour le soutien de la flore intestinale naturelle des chiens et chats. Contient une souche de bactéries probiotiques naturellement présentes dans le tractus intestinal sain. Contient aussi un prébiotique qui soutient la croissance des bactéries utiles dans le tractus intestinal, et de la bentonite, un agent naturel adsorbant et thixotrope.

Soutient le tractus intestinal. Favorise le microbiome et la santé intestinale. Une triple combinaison de probiotiques, de probiotiques et d'argile naturelle.

Constituants analytiques

Protéines brutes	6,0 %
Fibres brutes	1,5 %
Huiles et matières grasses brutes	41,1 %
Cendres brutes	21,1 %
Cendres insolubles	
dans l'acide chlorhydrique	13,0 %

Composition

Huile de soja, levure inactivée, farine de protéines de lupin, glucose, chlorure de sodium, phosphate disodique, huile de tournesol.

Additifs

Enterococcus faecium (DSM 10663/ NCIMB 10415) (stabilisateur de la flore intestinale) : 2 x 10¹² UFC par kg, Bentonite 1m558i (liant) : 16,5 %, Information disponible chez le distributeur.

Dosage et administration

Chats :
1-2 ml (deux fois par jour)
Chiots, chiens de petit taille (≤ 10 kg) :
2 ml (deux fois par jour)
Chiens de taille moyenne (11-25 kg) :
4 ml (deux fois par jour)
Chiens de grande taille (26-40 kg) :
6 ml (deux fois par jour)
Chiens de très grande taille (> 40 kg) :
8 ml (deux fois par jour)

Mode d'emploi

Tournez la bague sur le piston jusqu'au dosage souhaité et donnez Canikur® Pro mélangé à l'alimentation ou directement dans la gueule de l'animal. Ne pas dépasser les quantités recommandées. Après utilisation, il est recommandé de replacer le bouchon sur la seringue afin d'éviter que la pâte sèche.

Utilisez aussi longtemps que nécessaire ou suivant les recommandations du vétérinaire, mais pas plus de 4 semaines, pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale pendant les périodes de stress, de traitement antibiotique ou toute autre période pendant laquelle la flore intestinale peut être déréglée. En raison de la capacité de la bentonite à lier les macrolides, l'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.

Conservation

À conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
À conserver en dessous de 20°C.

Distributeur Belgique - Luxembourg

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Bruxelles/Brussel
HN105314
vetmedica.be@boehringer-ingelheim.com

Fabricant

Boehringer Ingelheim Animal Health
Reg. No: αGB2800019

N° du lot

Voir sur le côté de la boîte

À utiliser de préférence avant

Voir "EXP MM/AA" sur le côté de la boîte

Canikur® Pro



Orale pasta met natuurlijke ingrediënten

Aanvullend diervoeder voor honden en katten ter ondersteuning van de natuurlijke darmflora

Doseerspuit van 15 ml of 30 ml

Voor gebruik bij dieren

Aanvullend diervoeder ter ondersteuning van de natuurlijke darmflora bij honden en katten. Bevat een stam van probiotische bacteriën die van nature aanwezig is in het gezonde darmkanaal. Bevat ook een prebioticum dat de groei van nuttige bacteriën in het darmkanaal ondersteunt, en bentoniet, een natuurlijke bindende stof.

Ondersteunt het darmkanaal. Bevordert het microbiom en de gezondheid van de darmen. Een 3-voudige combinatie van prebiotica, probiotica en natuurlijke klei.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	6,0 %
Ruwe vezels	1,5 %
Ruwe olie en vetten	41,1 %
Ruwe as	21,1 %
As onoplosbaar in zoutzuur	13,0 %

Samenstelling

Sojaolie, geïnactiveerde gist, lupine-eiwitmeel, glucose, natriumchloride, dinatriumfosfaat, zonnebloemolie.

Toevoegingsmiddelen

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) (darmflora stabilisator): 2 x 10¹² KVE per kg, Bentoniet 1m558i (bindmiddel): 16,5 %, Informatie te verkrijgen bij de distributeur.

Dosering en toediening

Katten:
1-2 ml (tweemaal daags)
Pups en kleine honden (≤ 10 kg):
2 ml (tweemaal daags)
Middelgrote honden (11-25 kg):
4 ml (tweemaal daags)
Grote honden (26-40 kg):
6 ml (tweemaal daags)
Zeer grote honden (> 40 kg):
8 ml (tweemaal daags)

 Boehringer Ingelheim	AMT ING	PPM Code: 139623I-2602	
		SKU : 139491 / 139497 / 139623 / 139624	
Version:	3	Date:	14.04.2026
		Colors	
Product:	Canikur® Pro		Black
Component Type/Size:	Leaflet		T
Country(s):	Belgium / Netherlands		
Dimensions FLAT (HxWxD):	195 x 105 mm		
Dimensions FOLDED:	195 x 22 mm		
Scale/Font Size:	1:1		6.2 pt.
Spec/Dieline #:			
Manufacturer:	CMO ADM Protexin Limited		
		Finishing /Tech Info	
Cancel and Replace:	139623I-2404		
Printer Notes:			

Gebruik

Draai de ring op de doseerspuit tot de gewenste dosering en spuit de Canikur® Pro pasta in de voedingsbak of direct in de bek van de hond of kat. Geef niet meer dan de aanbevolen dosering. Het wordt aangeraden om de dop na gebruik op het uiteinde te plaatsen om uitdrogen te voorkomen.

Gebruik Canikur® Pro zolang het nodig is of volgens de aanwijzingen van de dierenarts, maar niet langer dan vier weken, om de natuurlijke balans van de darmflora te ondersteunen tijdens perioden van stress, een antibioticumbehandeling of andere momenten waarbij de darmflora ontregeld kan worden.

Aangezien bentoniet macroliden kan binden, moet gelijktijdig oraal gebruik met macroliden worden vermeden.

Bewaring

Op een droge plaats bewaren, beschermen tegen direct zonlicht. Bewaren beneden 20°C.

Distributeur Nederland

Boehringer Ingelheim Animal Health
Netherlands B.V.
Basisweg 10
1043 AP Amsterdam
Reg. no. 500197
vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com
+31 (0)20 - 7996950

Distributeur België

Boehringer Ingelheim Animal Health
Belgium SA
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brussel
HN105314
vetmedica.be@boehringer-ingelheim.com

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Animal Health
Reg. No: αGB2800019

Lot nr.

Zie zijkant doos.

Ten minste houdbaar tot

zie "EXP MM/JJ" op de zijkant van de doos

Canikur® Pro



Oralpaste met natuurlijke Inhaltsstoffen
Ergänzungsfuttermittel für Hunden und Katzen zur Unterstützung der natürlichen Darmflora

Dosierspritze von 15 ml oder 30 ml

Tierärztliche Nutzung

Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung einer gesunden Darmflora bei Hunden und Katzen. Enthält Probiotika, die natürlich in einer gesunden Darmflora vorkommen. Enthält Prebiotika, die das Wachstum gesundheitsförderlicher Bakterien im Darm unterstützen und Bentonit, ein natürliches Bindemittel.

Unterstützt den Verdauungstrakt.
Fördert das Mikrobiom und die Darmgesundheit.
Eine 3-fache Kombination aus Präbiotika, Probiotika und natürlicher Tonerde.

Analytische Inhaltstoffe:

Rohprotein	6,0 %
Rohfaser	1,5 %
Rohöl und -fette	41,1 %
Rohasche	21,1 %
HCl unlösliche Asche	13,0 %

Zusammensetzung

Sojaöl, inaktivierte Hefe, Lupinenproteinmehl, Glukose, Natriumchlorid, Dinatriumphosphat, Sonnenblumenöl.

Zusatzstoffe

Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415)(Darmflora-Stabilisator):
2 x 10¹² CFU per kg,
Bentonit 1m558 (Bindemittel): 16,5 %.
Information beim Vertreiber erhältlich.

Dosierung und Anwendung

Katze:

1-2 ml (zweimal täglich)

Welpen und kleine Hunde (≤ 10 kg):

2 ml (zweimal täglich)

Mittelgroße Hunde (11-25 kg):

4 ml (zweimal täglich)

Große Hunde (26-40 kg):

6 ml (zweimal täglich)

Sehr große Hunde (> 40 kg):

8 ml (zweimal täglich)

Verwendung

Drehen Sie den Ring an der Spritze bis zur gewünschten Dosierung und drücken Sie die Canikur® Pro Paste in den Futternapf oder direkt in das Maul des Tieres. Füttern Sie nicht mehr als die empfohlene Dosierung.

Nach der Verwendung die Spritze wieder mit der Kappe verschließen, um Verklumpung zu vermeiden.

Zur Unterstützung und Erhaltung einer gesunden Darmflora bei einem erhöhten Risiko für, während oder zur Regeneration von Verdauungsstörungen (Durchfall). Insbesondere verwendbar in Phasen von Stress, während antibiotischer Behandlung oder bei anderen negativen Einflüssen welche die natürliche Darmflora stören könnten.

Verwenden Sie Canikur® Pro so lange, wie es als notwendig erachtet wird oder vom Tierarzt empfohlen wurde, aber nicht länger als 4 Wochen.

Da Bentonit Makrolide binden kann, sollte die gleichzeitige Einnahme vermieden werden.

Aufbewahrung

Trocken lagern, vor Sonnenlicht geschützt.
Unter 20 °C lagern.

Vertrieb

Belgien - Luxemburg

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA
Arnaud Fraiteurlaan 15-23
1050 Brüssel
HN105314
vetmedica.be@boehringer-ingelheim.com

Hersteller

Boehringer Ingelheim Animal Health
Reg. No: αGB2800019

Lot nr.

Siehe Packungsseite.

Mindestens haltbar bis

siehe "EXP MM/JJ" auf der Seite der Verpackung

139623I-2602