



BIJSLUITER

LIDOCAÏNE 3% Vaselinecrème

Lees de hele bijsluiter goed vóóordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Lidocaïne werkt verdovend en maakt de huid gevoelloos. Het wordt gebruikt bij plaatselijke pijn, branderigheid en jeuk, voornamelijk bij aambeien en scheurtjes in de anus. De vaselinecrème vormt een beschermend laagje op de huid. Hierdoor neemt de irritatie af.

Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Lidocaïne, voor stoffen die hierop lijken (andere plaatselijk verdovende geneesmiddelen) of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als u bloedende aambeien heeft.
- Als u open wondjes heeft op de plekken waar u dit geneesmiddel moet aanbrengen. De genezing hiervan wordt door dit geneesmiddel geremd.
- Als u porfyrie (stofwisselingsziekte) heeft. Lidocaïne kan een aanval uitlokken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?

- Als de plaats waar u de crème moet smeren, ontstoken is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast LIDOCAÏNE 3% Vaselinecrème nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Van dit geneesmiddel zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruik op dezelfde te behandelen plekken alleen andere geneesmiddelen na overleg met uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

's ochtends en 's avonds dun op de jeukende of pijnlijke plekken aanbrengen. Bij gebruik in en rond de anus de crème ook na iedere ontlasting aanbrengen.

Wijze van gebruik:

- Gebruik bij voorkeur een vingercondoom, dit is een hoesje dat u over de vinger kunt aanbrengen. Het is verkrijgbaar in de apotheek.
- Bij gebruik in en rond de anus: maak de anus schoon, bij voorkeur met een watje met olie, om het irriterende vocht te verwijderen. Smeer de crème dun op de huid rond en in de anus. De tube is ook leverbaar met een canule (tuitje). U kunt de crème dan wat dieper in de anus brengen.

Was na gebruik uw handen.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?

Als u te veel LIDOCAÏNE 3% Vaselinecrème heeft aangebracht, kunt u de overtollige hoeveelheid afvegen.

Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?

Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel

Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- irritatie van de huid waar de crème aangebracht wordt
- overgevoeligheidsreacties zoals sterke jeuk, zwelling en roodheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen.

Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?**

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Lidocaïne.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn cetomacrogolwas, propyleenglycol, vloeibare paraffine, witte vaseline en gezuiverd water.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

LIDOCAÏNE 3% Vaselinecrème is een witte crème en bevat 30 mg Lidocaïne per gram crème.

De crème is verpakt per 30 gram in een aluminium tube met schroefdop.

De tube is verpakt in een omdoos.

Fabrikant:

GMP Apotheek De Magistrale Bereider

A. van Leeuwenhoekstraat 16

3261 LT Oud-Beijerland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in JANUARI 2012.