

DOODT HOOFDLUIZEN EN NETEN

Leef deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt.

Wat is Prioderm Dimeticon Lotion?

Prioderm Dimeticon Lotion is een anti-hoofdluizen en anti-neten doodt. Het kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar. Prioderm Dimeticon Lotion is gemakkelijk te gebruiken en werkt binnen 15 minuten. Het is een biocompatibele lotion op basis van Dimeticon, inclusief producten voor kinderen, hoofdluizen kunnen niet weerstaan worden voor Prioderm Dimeticon Lotion omdat het niet is gebaseerd op insecticiden, maar de hoofdluizen doodt door verstikking.

Prioderm Dimeticon Lotion bestaat uit:

1. Prioderm Dimeticon Lotion Fls, 500 ml, Bestanddelen: Dimeticon, toefenylacetaat, arylmethylpolysiloxaan, armoedolie.
2. Fijnstreekde neersproeiëerbuis.
3. Gebruiksaanwijzing met informatie over hoofdluizen en hoe Prioderm Dimeticon Lotion te gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing voor toetsmethode gebruik.

Wat is hoofdluis?

Hoofdluizen zijn bloedzuigende insecten zonder vleugels. Het zijn parasieten die zich voeden met bloed van mensen. Hoofdluizen en neten (luizen) worden vaak achter de oren, langs de haartjes en in de nek aangetroffen, omdat deze plekken warm en donker zijn. Dit kan van de hoofdluizen kan aanvallen van aanleiding tot jeuk, roos, zwart, rood of zich gevond hebben met kleine, witte eitjes op het haar. De neten zijn meestal 2-4 mm lang. De neten zijn meestal 1 mm groot en zijn wit. Ze kunnen lijken op zandkorrels of witte en worden gevonden op het haar dat zich het dichtst bij de hoofdluis bevindt.

De levenscyclus van de hoofdluis kan drie weken duren, indien een volwassen luizen De volwassen vrouwtjes heeft de neten in het haar van met een soort lijn, met een lengte van 1 mm van de hoofdluis. Neten blijven zitting van het haar zitten, wat betekent dat dit afvalt tot de hoofdluis heroverne ruimschoots het haar groeit. Na maximaal 10 dagen komt er een eind aan de neten. Na maximaal 12 dagen is deze neten een volwassen kan gevonden. De totale levenscyclus van neten tot volwassen kan twee maanden drie weken.

Bestandteil hoofdluis, heeft normaal gesproken op deze direct contact en wordt gevonden onder kinderen verspreid tijdens het spelen. Hetten, vaak, bevindt en dringende voorzorgsmaatregelen kunnen afkomstig zijn bestemming overtuigen op deze itemen juist die deze itemen worden gebruikt.

Waar wordt Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt?

Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en met voldoende beschrijving van hoofdluis te versieren.

1. Breng Prioderm Dimeticon Lotion aan op droog haar

Leg voordat u begint een lichtgekleurde handdoek over de schouders van de te behandelen persoon. Druk het drippende van de punt van de applicatorfls. Breng de lotion met de applicator, over de gehele hoofdluis gebied aan. Werk vanaf het voorhoofd richting de kruin. Ga verder naar beneden van de kruin naar de oren en van de kruin naar de achterkant van de nek. Masseer Prioderm Dimeticon Lotion grondig op de hoofdluis en over het hele haar. Breng een cotype haarvezelheid Prioderm Dimeticon Lotion aan om al het haar van de hoofdluis tot aan de haarpunten te bedekken. De aanrakinge haarevezelheid lotion is afhankelijk van de haareigen en het type haar. Naar de behandeling van haar op schouderlengte is 30-50 ml lotion nodig.

2. Laat Prioderm Dimeticon Lotion ten minste 15 minuten inwerken.

Gebruide deze tijd aan de hoofdluis doodt. Naam die worden, biocompatibel aan Prioderm Dimeticon Lotion worden, balneement in haar-omgeving en vloeistof kan mogelijk niet uit. De gebruiksaanwijzing bevat tips aan het haar zitten.

3. Was Prioderm Dimeticon Lotion uit met gewone shampoo

Breng het natte haarevezelheid shampoo **zonder water** aan en masseer het in het haar. Spoel daarna het haar uit met water. Indien nodig, herhaal het wasen met shampoo, zodat veilig haar na de behandeling wordt voorkomen. Bij lang haar wordt aanbevolen om een conditioner te gebruiken om het kammen te vergemakkelijken.

4. Gaan het netje haar grondig uit

Gebruik de voorgedruide neten om drie hoofdluizen te verwijderen. Kan die stof van het hoofd opzamen. Druk met goede lichtsterktevligheid dan tijdens het kammen, bij daglicht. Spoel de vliegje kam na elke kammenwijziging of om drie hoofdluizen te verwijderen. De neten moeten voorzichtig met de hand uit het haar worden verwijderd.

5. Herhaal de behandeling na 9-10 dagen

Herhaal stap 1 tot 4 na 9-10 dagen van de uitgangscyclus neten te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat de levenscyclus van de hoofdluis volledig wordt afgebroken met enig belangrijk is voor een succesvolle behandeling, ook al behandelen Prioderm Dimeticon Lotion de ontwikkeling van neten.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Als meerdere gezinsleden lijden aan hoofdluis, behandel dan alle besmette gezinsleden op dezelfde dag met Prioderm Dimeticon Lotion om herbesmetting te voorkomen. Gebruik de voorgedruide neten om het haar van andere gezinsleden te controleren op hoofdluis.

- Als er opnieuw een besmetting optreedt tussen de eerste en de tweede behandeling, bijvoorbeeld door direct contact met personen die besmet zijn met hoofdluis, behandel dan opnieuw met Prioderm Dimeticon Lotion herhaal na 9-10 dagen. Het product is veilig in gebruik in een bad of badje.
- Prioderm Dimeticon Lotion is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen vanaf 1 jaar.
- Er zijn geen risico's bekend bij het gebruik van Prioderm Dimeticon Lotion tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Het wordt echter aanbevolen om geen gebruik van arts of apotheker te raadplegen.
- Het gebruik bij kinderen moet worden aangevoerd door een volwassene.
- Als Prioderm Dimeticon Lotion op de vlist of een ander oppervlak wordt gebruikt, kan droog-glad worden.
- Uitsluitend voor afwendig gebruik, niet wassen. Neem bij innakken contact op met uw arts of een haareigen, hoofd de verpakking bij de hand om de arts te helpen het probleem te identificeren.
- Gebruik Prioderm Dimeticon Lotion niet na de hoofdwedderduren.
- Prioderm Dimeticon Lotion kan lichte irritatie veroorzaken. Contact met ogen, goet spoelen met water.
- Prioderm Dimeticon Lotion kan jeuk of irritatie op de hoofdluis of in de nek veroorzaken.
- Hoofdluisen zijn niet de bract van een vaat. Gebruik een andere ontbijttingsmiddelen.

Contraindicaties

- Prioderm Dimeticon Lotion mag niet worden gebruikt op of door personen die grondig zijn vlist aan van de bestaande. Als u huidlij, prioderm Prioderm Dimeticon Lotion dan voor het eerste gebruik af op een klein stukje huid.
- Stop het gebruik en raadpleeg uw arts als u een gevoel van afgebreide reactie of een andere ongebruikelijke bijwerking ervaart.

Bewaren

Bewaar het product bij 20-30 °C, op een veilige plaats en buiten het bereik van jonge kinderen. Dit het laatste bewaren.

Druk na het aanbrengen de kleine drippende op de punt van de applicatorfls en bewaar deze samen met de gebruiksaanwijzing op de originele verpakking.

