

Aanwijzingen voor gebruik van Sab Simplex:

De totale dosis mag niet worden overschreden zonder een arts of apotheker te raadplegen.

Hoe te gebruiken Sab Simplex druppels?

Neem het medicijn onverdund in. U kunt Sab Simplex ook verdunnen met water of thee. Voor baby's kunt u het geneesmiddel rechtstreeks in de fles geven of met een theelepeltje toedienen voor de borstvoeding. Goed schudden voor gebruik.

Duur van gebruik van Sab Simplex druppels?

De duur van het gebruik hangt af van de aard van de symptomen en/of het verloop van de ziekte.

Overdosis?

Er zijn geen symptomen van overdosering met Sab Simplex bekend. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

In het algemeen geldt: Let op een gewetensvolle dosering, vooral bij baby's, kleine kinderen en bejaarden. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker naar eventuele bijwerkingen of voorzorgsmaatregelen.

Een door de arts voorgeschreven dosering kan afwijken van de informatie in de bijsluiter. Aangezien de arts het individueel zal aanpassen, moet u het geneesmiddel dus gebruiken volgens zijn of haar instructies.

Hoe werkt het ingrediënt van het Sab Simplex geneesmiddel?

Het actieve bestanddeel van Sab Simplex helpt tegen winderigheid. Dit wordt veroorzaakt door opgekropte gassen in het maagdarmkanaal, die de vorm hebben van een fijn schuim. Het actieve bestanddeel bevordert het vrijkomen van de gassen door dit schuim te vernietigen. Overmatige gasvorming in het maagdarmkanaal en verhoogde gasvorming na operaties:

Pasgeborenen 4 maal daags 10 druppels

Zuigelingen van 4 weken tot 12 maanden 15 druppels

Kinderen van 1-6 jaar: 15 druppels (0,6 ml) 23 maal daags (maximaal 14 ml per dag) bij of na de maaltijd, eventueel voor het slapen gaan.

Kinderen en adolescenten van 6-18 jaar 20-30 druppels

Volwassenen 30-45 druppels (overeenkomend met 1,2-1,8 ml)

Indien nodig kan de gebruiksfrequentie (totale dagelijkse dosis) worden verhoogd bij kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen.

Ter voorbereiding op beeldvormende onderzoeken: Het medicijn wordt gedoseerd door uw arts.

Vaatwas vergiftiging: Omdat dit een noodgeval is, wordt de dosering individueel en door een arts gedaan.

gebaseerd op 1 ml Tropfen = 25 Tropfen

69,19 mg Simeticon

64 mg Dimeticon 350

+ Carbomer 974 P

+ Citronensäure monohydrat

+ Hypromellose

+ Natrium citrat

1 mg Natriumbenzoat

+ Natrium cyclamat

+ Polyethylenglycol-x-stearylether

+ Saccharin natrium

+ Sorbinsäure

+ Himbeer-Aroma, 60373, Haarmann & Reimer

0,18 mg Ethanol

+ Vanille-Aroma 200817

+ Wasser, gereinigtes