



# Paracof

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

**Uiterlijk**  
Overtuigt u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:  
De tabletten zijn (bijna) wit, rond, plat en hebben een breukstreep en de inscriptie "Paracetamol comp".

**Verpakkingsvorm**  
De tabletten zijn verkrijgbaar in een doordrukstripverpakking van 20 stuks.

**Samenstelling**  
De werkzame stoffen zijn paracetamol en cafeïne. Iedere tablet bevat 500 mg paracetamol en 50 mg cafeïne. Als hulpstoffen voor de 500 mg tabletten zijn gebruikt: maïszetmeel, gelatine, talk, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

**Hoe werkt ROTER Paracof**  
Paracof behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende middelen.

**Inschrijving**  
De registratiehouder van dit geneesmiddel is Imgroma BV, Sortieweg 47, Maastricht.  
Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:  
RVG 28772=55048 ROTER Paracof, tabletten.

**Voor wie is ROTER Paracof bestemd**  
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met:

- hoofdpijn
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn

**Wanneer mag u ROTER Paracof niet gebruiken**  
De registratiehouder van dit geneesmiddel is Imgroma BV, Sortieweg 47, Maastricht.  
Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:  
RVG 28772=55048 ROTER Paracof, tabletten.

**ROTER Paracof bij zwangerschap en borstvoeding**  
Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding moet u dit middel uitsluitend op advies van uw arts gebruiken.

**Beïnvloedt ROTER Paracof de rijvaardigheid en het reactievermogen?**  
Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

**Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen**  
Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Middelen waarvan bekend is, dat zij de werking van paracof kunnen beïnvloeden of waarvan paracof de werking kan beïnvloeden, zijn:

- chlooramfenicol (middel bij bepaalde bacteriële infecties): de werking van chlooramfenicol kan toenemen.
- zidovudine (middel bij de behandeling van AIDS): bij langdurig gebruik kan een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) vaker optreden.
- bij langdurig en veelvuldig gebruik van alcohol en bij gebruik van sommige slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten) kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met paracof.

**Waarschuwingen en voorzorgen**  
Wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.  
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van paracof wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft. Wanneer u langdurig en veelvuldig alcohol gebruikt, mag u niet meer dan 2 gram paracof per dag gebruiken.

**Aanwijzingen voor het gebruik**  
De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden.  
Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen.  
De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdscategorie.  
Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan.

**Dosering**  
In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:

*Kinderen van 6 tot 9 jaar:* een halve ( $\frac{1}{2}$ ) tablet van 500 mg 4-6 maal per dag.  
*Kinderen van 9 tot 12 jaar:* één tablet van 500 mg 3-4 maal per dag.  
*Kinderen van 12 tot 15 jaar:* één tablet van 500 mg 4-6 maal per dag.  
*Volwassenen:* één of 2 tabletten van 500 mg per keer, maximaal 6 tabletten per dag.

**Verschijnselen en behandeling van overdosering**  
Als er teveel is ingenomen kan een beschadiging van de lever optreden. De eerste symptomen hiervan zijn: verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.  
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij te laat handelen kan ernstige schade aan de lever optreden.

**Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van ROTER Paracof**  
Het gebruik van ROTER Paracof kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: overgevoeligheid, zoals huiduitslag, galbulten en koorts. Zelden kunnen afwijkingen in het bloed (bloedarmoede, onverklaarbare bloeditstoringen) voorkomen. Na langdurig gebruik kan in zeldzame gevallen een zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond voorkomen (agranulocytose). Na een zeer langdurig gebruik van hoge doseringen is een enkele maal een nierontsteking opgetreden. Wanneer langdurig hoge doseringen worden gebruikt (3-4 gram per dag) kan leverbeschadiging optreden.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

**Hoe moet ROTER Paracof bewaard worden**  
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.  
Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij 15-25°C.

**Hoe lang kan ROTER Paracof bewaard worden**  
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar).  
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na).  
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apothekier inleveren ter vernietiging.