

BINSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg, capsules

LEZEN VOORU

Loperamide hydrochloride

- Lees de hele binsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
- Het geneesmiddel kan zonder toezicht verkregen worden. Daarom moet u Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg zorgvuldig gebruiken en eer goed resultaat te bereiken:
- Bewerkt deze hulpster. Het kan minder zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, neem dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verzuimtoestand verergeren of niet verbeteren na 3 dagen.
- Wanneer u er van de bijwerkingen er wijg wordt, of als er bij u een hoge werveling optreedt die niet in deze bijblader is vermeld, neem dan direct uw arts of apotheker.

In deze bladluite:

1. Wat is Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Wel u moet weten voordat u Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg gebruikt
 3. Hoe wordt Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg gebruikt?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewerkt u Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg
 6. Aanvullende informatie
- ### 1. WAT IS DIARREEVERREMMER HTP LOPERAMIDE HCl 2 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Loperamide is een alleen op de darmwand werkend anti-diarrheem middel. Loperamide stopt de gangbare darmbewegingen in de darmen. Het verminderd de te sterk vooruitlopende bewegingen van de darm.

Toepassing van het geneesmiddel

Het wordt gebruikt voor de behandeling van de vaakjarige of een acute (one dikkende en droge) diarree die geen voorbijgaande en chronische (langdurige) diarree is.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U DIARREEVERREMGER HTP LOPERAMIDE HCl 2 MG GEBRUIKT

- Gebuik Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg niet als verstopping heelt moet worden verminderd, als bijvoorbeeld geconcomitante en/of darmen die (gevolg van bestoelen) veel langer. De behandeling met loperamide moet om deel uitmaken van andere maatregelen tegen verstopping, maar oogzame bulk of een incomplete darmontlasting voorkomen.
- * Bij acute behandeling bij een slakende diarree, moet worden gekenmerkt door luste in de ontlasting en hoge mate anale dysfunktie.
 - * Bij verstopping uitsluitende zwartte ontstoppen van de dikte der...
 - * Bij ontstoppen van de dikke darm die in verbond staat

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn voldoende gegevens beschikbaar over gebruik van loperamide bij zwangerschap. Er zijn geen schadelijke effecten op de zwangerschap, dus de gezondheid van baby niet gehinderd kunnen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij borstvoeding. Bent u zwanger of wilt u in verwachting staan? Overleg dan eerst met uw arts of Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg gebruiken.

Loperamide komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terug. Het gebruik van loperamide tijdens de periode van borstvoeding wordt aangeraden. Overleg hiervoor zorgelijk met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel innemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machinæ

Bij het beschrijven van voorvalen en machinæ dat u rekening moet houden met de mogelijkheid van duizelgevoel of de zichtbaarheid gevallen gevonden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Diarreeverremmer HTP Loperamide HCl 2 mg

De capsules bevatten kleurstoffen die een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. De kleur bloed is groter dan de overgevoeligheid voor azo-dygalarmine. Oogneus beschikt geen middel 1,27 mg loperamide per capsule, indien uw arts u hoeft te gegeven dat u mogelijk blijkt niet vertrouwd, neem dan contact op met dearts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT DIARREEVERREMGER HTP LOPERAMIDE HCl 2 MG GEBRUIKT

Uitvoering

Vier verschillende soorten tabletten zijn beschikbaar:

Acute diarree

In voorraad:

Begintablet: 2 capsules in een...

Onderhoudstablet: Bij aanhouden van diarree moet dagelijks 2 uur één capsule binnen (maximaal 8 capsules per dag - 24 uur).

Kinderen boven 0 jaar:

Begintablet: 1 capsule.

Onderhoudstablet: Bij aanhouden van diarree moet dagelijks 2 uur één capsule binnen (maximaal 3 capsules per dag - 24 uur).

Chronische diarree

Bij chronische diarree moet de dosis zo weinig mogelijk aangepast worden tot dat de nodige symptome ontstopping wordt geproduceerd. Het verdient aandacht van u dat het niet te gaan al de dosis kan worden verhoogd of de behandeling overbuis moet worden.

De volgende bijwerkingen komen slechts voor bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten:

Zeldzaamheid: onbekend.

Meestvoorkomende onbekend: buikpijn, windergheid, onsoekbaarheid, darmchirurgie, opgeschotken, breken.

Lid- en oordichaadswijzigingen: juk, huid, hals, mondholte.

Allgemeene aanwijzingen en lichaamsgebeurtenissen:

allergische reacties.

De volgende bijwerkingen komen slechts voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten:

Meestvoorkomende onbekend: verstuifde oksel, darm, gesloten spijsvertering met als verschijnselen vol genoeg in de buikbulk, pijn in de maagstreek, hoesten, nasale stijfheid, rechters of zuur vocht.

Huid- en onderhuidscheenigheden: zwelling en huidaaltig.

Vel blaarmetting, hu duizig, roze onregelmatige vlekken (erythema multiforme), eruitige, pijnlijke (excrustatieve) desquamatie geassocieerd met smeren en blaren op de huid of versplijning van de huid (toxisch epidermaal necrolyse).

Hoge, grove ontstekingsreacties; sel te blijven van vette in de huid als gevolg van een geelachtige blaarmetting.

Allgemeene aanwijzingen en lichaamsgebeurtenissen:

chock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust,

zweetende stille pijn, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke verzuivering).

Waarschuwing: één van de bijwerkingen: eenige weel of als er bij u een opzwelling optreedt of niet in deze reacties te verwachten, meldt dan uw arts of apotheker.

6. HOE BEWAART U DIARREEREMMER HTP

LOPERAMIDE HCl 2 mg

Bewaren in de oorspronkelijk verpakking. Bewaren buiten bereik en zicht van kinderen en huisdieren.

Dabur-Diarrheeremmer HTP Loperamide HCl 2 mg niet tegen de veroudering stellen die staat vermeld op de verpakking na. Niet te gebruiken na "t/m" "Exp." De veroudering vervalt op de laatste dag van die maand.

Gebruiksmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het chakraal of milieuhetvaardig civiel vrije; uw apotheker zal u met medelijden minst over van een nieuw middel wijzen. Deze voorzorgsmaatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Diarrheeremmer HTP Loperamide HCl 2 mg
• Het werkzame bestanddeel is loperamide hydrochloride.
• De andere bestanddelen zijn lactose monohydrat, maagzuurzalf, kalk, magnesiumcarbonaat, gelatine, kleurstof (E171), ethylcellulose (E164), indigochine (P152), kanariegeel (E102) en zinkoxyde zwart (E172).

Hoe ziet Diarrheeremmer HTP Loperamide HCl 2 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Diarrheeremmer HTP Loperamide HCl 2 mg is een geneesmiddel in de vorm van capsules.

Het middel is verpakt in coördinatstrips van 10 capsules met daarbij een 10 stuks in een dosisfles in een flacon met 30, 60, 120, 240, 480, 1000, 1500, 2000, 2500 of 3000 capsules.

Met deze gevraagde verpakkingseenheden worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en te verkopen

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Healthpharma B.V.

Nieuw Dordt 3

4519 AC Cheet-Leur

Noord-Brabant

Fabrikant

STADA Arzneimittel AG

2646 Kuttertal 2 - 4 R

Wat bevat Omeprazol HTP Loperamide HCl 2 mg
• Het werkzame bestanddeel is loperamide hydrochloride.
• De andere bestanddelen zijn: lactose monohydraat, magnesium stearate, lactose, titanium dioxide (E 171), chitosan (E 04), indigotine (E132), jzeroxyd (E172) en celstof zwart (E 172).

Hoe ziet Omeprazol HTP Loperamide HCl 2 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

Dienstremmer HTP Loperamide HCl 2 mg is een geneesmiddel in de vorm van capsules.

Het middel is verkrijgbaar in doosverpakkingen van 10 capsules met respectievelijk van 10 stuks in een dosisje of in een doos met 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 1000, 1500, 2000, 2500 of 3000 capsules.

Klik op de genoemde verpakkingsopties voor meer info die hierin gedrukt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Healthypharm B.V.

Nieuwe Dreef 3

4817 AC Eeten Leur

Nederland

Faxnummer:

STADA Arzneimittel AG

Altmarkstraße 2 - 16

61111 Berlin

Duitsland

In het register ingeschreven onder RIVG:

RIVG 20540-15140, Dienstremmer HTP Loperamide HCl 2 mg, capsules.

Dit bijzonder is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2019.

Rev. no. 6.0
1R29 BU004

Healthypharm