

MULTI PAPA

Order 1001 de medicamente si/si de curatenie



1. Indicatii de utilizare si contraindicatii

1. Se recomandă în cazurile:
2. Anemie și/sau insuficiență de fier în organism
3. Anemie și/sau insuficiență de fier după operații
4. În perioada sarcinii și
5. În perioada alăptării

1. Se recomandă în cazurile:

1. Anemie și/sau insuficiență de fier

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

NUMĂRUL MATERIEI PRIME	NUMĂRUL MATERIEI PRIME	UNITATE MĂSURĂ	CONȚINUT
1	1	g	50
2	1	g	50
3	1	g	50
4	1	g	50
5	1	g	50
6	1	g	50
7	1	g	50
8	1	g	50
9	1	g	50
10	1	g	50
11	1	g	50
12	1	g	50
13	1	g	50
14	1	g	50
15	1	g	50
16	1	g	50
17	1	g	50
18	1	g	50
19	1	g	50
20	1	g	50
21	1	g	50
22	1	g	50
23	1	g	50
24	1	g	50
25	1	g	50
26	1	g	50
27	1	g	50
28	1	g	50
29	1	g	50
30	1	g	50
31	1	g	50
32	1	g	50
33	1	g	50
34	1	g	50
35	1	g	50
36	1	g	50
37	1	g	50
38	1	g	50
39	1	g	50
40	1	g	50
41	1	g	50
42	1	g	50
43	1	g	50
44	1	g	50
45	1	g	50
46	1	g	50
47	1	g	50
48	1	g	50
49	1	g	50
50	1	g	50

NUMĂRUL MATERIEI PRIME	NUMĂRUL MATERIEI PRIME	UNITATE MĂSURĂ	CONȚINUT
51	1	g	50
52	1	g	50
53	1	g	50
54	1	g	50
55	1	g	50
56	1	g	50
57	1	g	50
58	1	g	50
59	1	g	50
60	1	g	50
61	1	g	50
62	1	g	50
63	1	g	50
64	1	g	50
65	1	g	50
66	1	g	50
67	1	g	50
68	1	g	50
69	1	g	50
70	1	g	50
71	1	g	50
72	1	g	50
73	1	g	50
74	1	g	50
75	1	g	50
76	1	g	50
77	1	g	50
78	1	g	50
79	1	g	50
80	1	g	50

81. În cazurile de sarcină și/sau insuficiență de fier în organism
82. Anemie și/sau insuficiență de fier în organism
83. Anemie și/sau insuficiență de fier după operații
84. În perioada sarcinii și
85. În perioada alăptării

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

2. Mod de utilizare și contraindicatii

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

2. Mod de utilizare și contraindicatii

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

3. Mod de utilizare și contraindicatii

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

4. Se recomandă în cazurile:

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)

Se recomandă în cazurile de sarcină (după consult)