

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Calmurid OTC

ureum

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Calmurid OTC en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Calmurid OTC en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Calmurid OTC behoort tot de zogenaamde keratolytica. De ureum in Calmurid OTC breekt een te grote hoeveelheid verhoornde cellen af en verhoogt de wateropnamecapaciteit van de huid.

Calmurid OTC wordt gebruikt bij huidaandoeningen die gepaard gaan met een droge sterk verhoornde huid.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

Als u open wonden of een ontstoken huid heeft. Gebruik Calmurid OTC niet op open wonden of op een ontstoken huid

Calmurid OTC is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing op de huid, op de plaats waar de huid is aangedaan. Calmurid OTC is niet bestemd voor aandoeningen in en nabij de ogen. Vermijd contact met de ogen en de oogomtrek. Indien dit toch gebeurt, spoel dan overvloedig met water.

Het product mag niet in ruime mate worden gebruikt als u last hebt van een ernstige nierfunctiestoornis, vanwege een mogelijke opname van ureum door de huid.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Calmurid OTC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties (onderlinge beïnvloedingen) met andere geneesmiddelen bekend. Echter op de behandelde huid mag u niet gelijktijdig andere geneesmiddelen of cosmetica aanbrengen, omdat daardoor de stabiliteit en opname in de huid van deze laatstgenoemde producten kan veranderen. Ureum kan het binnendringen van andere werkzame stoffen in de huid versterken, bij toepassing op hetzelfde huidgedeelte. Dit is vooral bekend voor corticosteroiden, ditranol en 5-fluoro-uracil.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Er worden geen effecten tijdens de zwangerschap verwacht, aangezien ureum en melkzuur normaliter in het lichaam worden aangetroffen, ook bij zwangere vrouwen. Calmurid OTC kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit klinisch nodig is.

Borstvoeding

Er zijn gegevens beschikbaar over het gebruik van Calmurid OTC tijdens de borstvoeding. Echter, kan Calmurid OTC tekenen van huidirritatie bezorgen, zodat de gevoelige huid van de baby bij aanraking van de behandelde borst mogelijk geïrriteerd kan raken. Daarom dient bij vrouwen die borstvoeding geven het product van de borst te worden verwijderd voordat borstvoeding wordt gegeven.

Vruchtbaarheid

Er zijn gegevens bekend over de invloed van ureum op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft het gebruik van dit geneesmiddel geen effect op het vermogen om een auto te besturen of een machine te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering is als volgt:

- Reinig de huid met water en breng daarna een dunne laag crème twee- tot driemaal per dag op de huid aan.
- Wanneer de huid zacht en soepel is geworden, brengt u de crème met grotere tussenpozen aan. Bij het wassen van de behandelde huid wordt de crème verwijderd en dan moet u de crème opnieuw aanbrengen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Calmurid OTC is uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op de huid. Bij te sterke pijn of branderig gevoel na overmatig gebruik op de huid moet u de crème afspoelen met veel water. Het is niet te verwachten dat het per ongeluk innemen van de crème gevolgen heeft.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u Calmurid OTC vergeten bent aan te brengen, hoeft u dit niet een extra keer aan te brengen, maar gaat u gewoon verder zoals u gewend bent. Neem geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen indien u plotseling met het gebruik van Calmurid OTC stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden op die plaatsen waar de crème is aangebracht:

- irritatie, branderig gevoel en uitslag. Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor, dat wil zeggen bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

- roodheid van de huid (erytheem) en pijnlijke huid. De frequentie van deze bijwerkingen is niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na eerste opening van de tube, product nog 6 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is ureum. Elke gram crème bevat 100 mg ureum.
- De andere stoffen in dit middel zijn: melkzuur (E270), glycerolmonostearaat (E471), betaïnemono-hydraat, diethanolamine-cetylfosfaat, hard vet, cholesterol, natriumchloride en gezuiverd water.

Hoe ziet Calmurid OTC eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Calmurid OTC is een witte crème, en wordt geleverd in LDPE-tubes met een inhoud van 50 of 100 gram.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Galderma Benelux B.V.
Gravinnen van Nassauboulevard 91
4811 BN Breda
Nederland

Fabrikant

Laboratoires GALDERMA
Zone Industrielle Montdésir
F- 74540 Alby Sur Cheran
Frankrijk

RVG nummer

Calmurid OTC is in het Register ingeschreven onder RVG 20297.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2018.