



Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Het geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Norit 200 zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw apotheker of drogist, als u meer informatie of advies nodig hebt.
- Ga naar uw arts, als uw verschijnselen verergeren of na 3 dagen niet verbeteren.

#### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Norit 200 en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Norit 200 inneemt
3. Hoe wordt Norit 200 ingenomen ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Norit 200 ?

### **NORIT 200** **Capsules** **200 mg geactiveerde kool**

De werkzame stof is geactiveerde kool ('carbo activatus'). De andere bestanddelen zijn gelatine, titaandioxide (E 171) en zwart ijzeroxide (E 172).

Registratiehouder: Norit N.V.,  
Nijverheidsweg-Noord 72, Amersfoort.  
Voor inlichtingen en correspondentie:  
**VEMEDIA** B.V., Diemen  
Vemediainformatielijn: 0900 2333666  
(€ 0,15 p/min)

In het register ingeschreven onder  
RVG 09116.

#### **1. Wat is Norit 200 en waarvoor wordt het gebruikt ?**

Norit 200 zijn harde capsules van gelatine die geactiveerde kool van plantaardige herkomst bevatten. Geactiveerde kool is zwart van kleur. De stof kan door haar grote inwendige oppervlak in het maagdar kanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen binden (adsorberen).

De capsules bevatten geen suiker en kunnen zonder bezwaar door diabetici gebruikt worden.

Norit 200 is verpakt in PVC/Al strips van 15 onbedrukte capsules. Een verpakking bevat 2 strips (30 capsules).

Norit 200 wordt gebruikt ter aanvulling van dieetmaatregelen bij acute diarree.

#### **2. Wat u moet weten voordat u Norit 200 gebruikt**

##### **Gebruik Norit 200 niet bij:**

Ernstige verstopping van het maagdar kanaal of verdenking daarvan, plotselinge buikpijn en met zweervorming gepaard gaande ontsteking van de dikke darm.

##### **Speciale waarschuwingen**

Door gebruik van de capsules kan de ontlasting zwart kleuren.

##### **Zwangerschap en borstvoeding**

Geactiveerde kool kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

##### **Rijvaardigheid en bediening van machines**

Gebruik van geactiveerde kool heeft geen nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

##### **Gebruik samen met andere geneesmiddelen**

Het gebruik van geactiveerde kool zal in het algemeen de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen. Gelijktijdig gebruik van geactiveerde kool en orale contraceptiva ('de pil') kan mogelijk de werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Een aanvullende methode van anticonceptie is dan wenselijk.

### **3. Hoe wordt Norit 200 gebruikt ?**

Neem 3-4 capsules per keer en maximaal 12 capsules per dag in. Verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de dag. Neem de capsules met water in.

*Wat u moet doen wanneer u te veel van Norit 200 heeft ingenomen?*

Na toediening van te hoge doses geactiveerde kool kunnen buikpijn en ernstige verstopping van het maagdarmkanaal ontstaan. Neem in voorkomend geval contact op met uw arts.

### **4. Mogelijke bijwerking(en)**

Verstopping (constipatie) kan optreden. Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

### **5. Hoe bewaart u Norit 200 ?**

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen. Niet bewaren boven een temperatuur van 30° C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet gebruiken na de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum.

Oktober 2002



zelfzorg.nl