



BUXATRAP

Buxatrap is een feromoonval voor het monitoren en wegvangen van buxusmotten (*Cydalima perspectalis*). Buxusmotten tasten diverse soorten buxussen aan in particuliere tuinen en boomkwekerijen. De buxusmot kan in korte tijd veel schade veroorzaken en zich snel uitbreiden. De feromonen in de Buxatrap lokken de mannelijke motten letterlijk in de val, door een soort specifiek feromoon af te geven. Buxatrap kan gebruikt worden in de periode dat de motten vliegen, van ca. mei tot eind november.

Werkzaamheid

Buxatrap wordt gebruikt in combinatie met feromonen. Feromonen (lokstof) geven de geur vrij van een soort specifiek seks-feromoon. Deze geur lokt de volwassen mannetjes van de betreffende plaag in de val. De mannetjes zijn vooral 's avonds en 's nachts actief. Telers kunnen de Buxatrap ook gebruiken om de aanwezigheid van de buxusmot te signaleren.

Verpakking & inhoud

Buxatrap wordt geleverd als compleet pakket inclusief;

- 1 x Buxatrap
- 1 x ophanghaakje
- 2 x feromoonhouder
- 2 x feromoon buxusmot (*Cydalima perspectalis*)

Bewaren & houdbaarheid

Buxatrap vereist geen speciale bewaarcondities. De optimale bewaar temperatuur voor feromonen is -18 tot 4 graden Celsius.

LET OP; raak de feromonen niet met uw handen aan in verband met vermindering van de werking na huidcontact.

Inzet & dosering

Zet de Buxatrap in elkaar en plaats de feromonen in de feromoonhouders; één in het groene deksel van de trap en één in het groene afdekkapje. U hoeft de Buxatrap niet te vullen met water. Bij lage buxussen tot ca. 1,5m hangt u de val op aan een drager. Bij hogere buxussen vanaf ca. 1,5m hangt u de val op ooghoogte. U dient de feromonen na 4 tot 6 weken te vervangen.

Aantasting	Dosering	Interval	Frequentie	Opmerkingen
Preventief	1 val / 180m ²	4-6 weken	Mei – nov	-
Licht curatief	1 val / 30m ²	4-6 weken	Mei – nov	-
Zwaar curatief	1 val / 30m ²	4-6 weken	Mei – nov	-