

Hoestpastilles met honing

Met **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles** heeft u gekozen voor een snelwerkend product dat helpt bij elke hoest tijdens een verkoudheid, voor zowel droge als vastzittende hoest. Daarnaast verzacht het keelpijn.

 **LEES GOED DE HELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DIT MEDISCH HULPMIDDEL GAAT GEBRUIKEN.**

Inhoud van de gebruiksaanwijzing

1. Wat zijn Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wat bevat dit middel?
3. Wat moet u weten voordat u dit middel inneemt?
4. Hoe neemt u dit middel in?
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat zijn Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles en waarvoor worden deze gebruikt?

De hoofdbestanddelen honing en heemstwortel in **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles** werken als een balsem die het ontstoken slijmvlies in de keel bedekt en daardoor verzacht. Het vormt een beschermende laag tegen vreemde deeltjes, waardoor droge, irriterende hoest wordt verlicht en het slijmvlies kan herstellen.

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles worden gebruikt als verzachtend middel voor de symptomatische behandeling van irritatie en ontsteking in de mond of keelholte als gevolg van verkoudheid, vocale belasting en bijbehorende heesheid en ruwe keel, bij zowel productieve als droge hoest.

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles verlichten snel elke hoest tijdens een verkoudheid, voor zowel droge als vastzittende hoest. Daarnaast verzacht het keelpijn.

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles bevatten voornamelijk natuurlijke ingrediënten en zijn alcoholvrij. Bovendien zijn ze lactosevrij, glutenvrij, vrij van kunstmatige kleurstoffen, vrij van genetisch gemodificeerde organismen en vrij van conserveermiddelen.

4. Hoe neemt u dit middel in?

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar:


1 tot 2 pastilles, 4 keer per dag (maximale dosis per dag is 8 pastilles).

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

1 pastille, 4 keer per dag (maximale dosis per dag is 4 pastilles).

Voor oraal gebruik (door zuigen laten oplossen in de mond).

5. Hoe bewaart u dit middel?

 Dit product niet gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de gegeven maand.

 Niet bewaren boven 25 °C.

 Bewaar de pastilles in de originele verpakking om de inhoud tegen licht te beschermen.

Houd dit medische hulpmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.

Voor bescherming van het milieu, vraag uw apotheker hoe u medische hulpmiddelen kunt weggooiden die u niet langer gebruikt. Deze maatregel helpt het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Hoe Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles eruit zien

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles zijn bruine, ronde pastilles.

Ze zijn verzegeled in PVC/PE/PVdC aluminium blisterverpakkingen van 20 stuks.

OVERIGE INFORMATIE

 **Fabrikant:**
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
23562 Lübeck, Duitsland

Distributeur:
Omega Pharma Nederland B.V.
Postbus 6612
3002 AP Rotterdam

 Batchnummer kunt u vinden op de blister en de verpakking.

CE 0482

Medisch hulpmiddel

Voor het laatst herzien in januari 2020.

Daarnaast helpen **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles** slijmvliezen in mond en keelholte te beschermen in geval van droogheid of gespannen stembanden, bijvoorbeeld door spreken of zingen met luide stem.

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles bedekken de stembanden met een beschermende laag en zorgen voor verlichting van symptomen zoals hoesten, kriebel in de keel en het schrapen van de keel.

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles kunnen overdag en 's avonds voor het slapen gaan, worden ingenomen. Door het verzachtende effect helpen de pastilles bij een kalme nachtrust en ondersteunen zo het herstel.

DROGE HOEST - KRIEBELHOEST

Droge of kriebelhoest is meestal hoest zonder slijm en kan verschillende oorzaken hebben. Aan het begin of aan het einde van een hoestcyclus bij een verkoudheid kan irritatie van de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen optreden.

Droge lucht, vreemde deeltjes zoals stof of allergenen, of virussen en bacteriën kunnen ook de slijmvliezen irriteren.


VASTZITTENDE HOEST - PRODUCTIEVE HOEST

De lichaamseigen slijmlaag, die de bronchiën vochtig houdt en ze beschermt tegen uitdroging, bestaat uit verschillende bestanddelen, bijvoorbeeld dode cellen, verschillende eiwitten en witte bloedcellen. In het geval van ziekten van de luchtwegen kan zowel de samenstelling als de kleur en consistentie veranderen. Als de slijmproductie toeneemt, probeert het lichaam het overtollige slijm uit de bronchiën te verwijderen door te hoesten. Het slijm wordt opgehoest in de mondholte waar het kan worden ingeslikt of worden uitgespuugd.

VERLICHTING VAN HOEST

De hoestreflex is essentieel om de luchtwegen vrij te maken. Deze wordt geactiveerd als er slijm aanwezig is dat moet worden opgehoest. Bij deze zogenaamde productieve hoest veroorzaakt het opgehoopte slijm hoesten. Vreemde deeltjes kunnen ook de hoestreceptoren activeren en de hoestreflex ("droge hoest") veroorzaken.

Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles kalmeren de hoestreflex in stadia van droge en vastzittende hoest door de hoestreceptoren te bedekken met een beschermende laag.



2. Wat bevat dit middel?

1 Bronchostop® DIRECT Hoestpastille bevat:

125 mg Droog Heemstwortelextract
125 mg Honing

Andere ingrediënten: Arabische Gom, maltitol, citroenzuur, sucralose, sinaasappelaroma, middellange ketenvetzuren, gezuiverd water.

3. Wat moet u weten voordat u dit middel inneemt?

Neem geen **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles** als u allergisch bent voor heemstwortel of honing of voor één van de andere bestanddelen van dit medische hulpmiddel zoals vermeld in rubriek 2. In geval van een allergische reactie, stop het gebruik van het product en raadpleeg uw arts.

WAARSCHUWING EN VOORZORGSMATREGELEN

Gebruik bij intoleranties voor suikers

Bij zeldzame erfelijke fructose-intolerantie of glucose-galactose malabsorptie mag dit product niet worden gebruikt, omdat het honing bevat.

Gelijktijdig gebruik van Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles met andere middelen

Als u andere middelen gebruikt, wordt het aangeraden om ze een ½ uur tot 1 uur voor of na inname van **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles** in te nemen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles** tijdens de zwangerschap of de borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar wordt niet aanbevolen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn en vanwege het risico op onopzettelijk inslikken van de gehele pastille.

Gebruik bij diabetes

1 Bronchostop® DIRECT Hoestpastille bevat 0,147 CU (koolhydraateenheden).

Raadpleeg een arts als:

- De symptomen na 5 dagen aanhouden of erger worden.
- Kortademigheid, koorts optreden of als u groen of geel slijm ophoest tijdens het gebruik van **Bronchostop® DIRECT Hoestpastilles**.