



TANDVLEES EXPERT
EXPERT DES GENCIVES

parodontax

HALEON

ORIGINAL
DAILY CARE

**DUO
PACK**
2X75ml



HELPT DE 3 VROEGE TEKENEN VAN BLOEDEND
TANDVLEES OM TE KEREN*

✓ ROODHEID ✓ ZWELLING ✓ SLECHTE ADEM
AIDE À INVERSER LES 3 PREMIERS SIGNES
DE SAIGNEMENT DES GENCIVES*
✓ ROUGEUR ✓ GONFLEMENT ✓ MAUVAISE HALEINE



Ⓢ FLUORIDE TANDPASTA, VOLG ALTIJD DE
AANWIJZINGEN OP DE VERPAK KING. Ploes 2x per dag
en niet vaker dan 3x, slik zo weinig mogelijk door en spug
uit. Niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar, tenzij op
advies van een tandarts. Raadpleeg een tandarts indien
bij volwassenen de symptomen aanhouden of bij kinderen
met bloedend tandvlees. Buiten bereik van kinderen
houden, indien irritatie optreedt, gebruik beëindigen.
Kartonnen verpakkingen zijn niet geschikt. Niet gebruiken als de
verpakking van de dop open is. Met elk productiefact
of bijwerkingen aan de fabrikant, uw voorsprijder of tandarts
of apotheker of tandarts.
Bij kinderen die niet alleen bij bloedend tandvlees
voorkomen, raadpleeg altijd uw tandarts.
1 Big tweemaal daags na het eten vegen met een
tandpasta zonder natriumcarbonaat.

Ⓢ DENTIFRICE AU FLUOR, TOUJOURS SUIVRE CES
CONSEILS. Brossez les dents 2x par jour et pas plus de
3x. Avec le moins de dentifrice possible et recrachez. Ne
cruise pas aux enfants de moins de 12 ans, sauf avis
contraire d'un dentiste. Consultez un dentiste si les
symptômes persistent chez les adultes ou en cas de
gencives qui saignent chez les enfants. Tenez hors de
portée des enfants. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation.
Ne pas utiliser si le film d'emballage est cassé. Les
enfants du carton ont été cotés. Ne pas utiliser si les
enfants du carton sont ouverts. Signalez tout incident
ou effet secondaire du produit au fabricant, à votre
dentiste ou à un pharmacien ou un dentiste.
Pour les signes qui ne se produisent pas uniquement
lors de saignements des gencives, consultez toujours
votre dentiste.
1 Avec un brossage de 10 secondes par jour par rapport à un
dentifrice sans bicarbonate de sodium.

Ⓢ FLUORIDE TANDPASTA, VOLG ALTIJD DE
AANWIJZINGEN OP DE VERPAK KING. Ploes 2x per dag
en niet vaker dan 3x, slik zo weinig mogelijk door en spug
uit. Niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar, tenzij op
advies van een tandarts. Raadpleeg een tandarts indien
bij volwassenen de symptomen aanhouden of bij kinderen
met bloedend tandvlees. Buiten bereik van kinderen
houden, indien irritatie optreedt, gebruik beëindigen.
Kartonnen verpakkingen zijn niet geschikt. Niet gebruiken als de
verpakking van de dop open is. Met elk productiefact
of bijwerkingen aan de fabrikant, uw voorsprijder of tandarts
of apotheker of tandarts.
Bij kinderen die niet alleen bij bloedend tandvlees
voorkomen, raadpleeg altijd uw tandarts.
1 Big tweemaal daags na het eten vegen met een
tandpasta zonder natriumcarbonaat.

Ⓢ DENTIFRICE AU FLUOR, TOUJOURS SUIVRE CES
CONSEILS. Brossez les dents 2x par jour et pas plus de
3x. Avec le moins de dentifrice possible et recrachez. Ne
cruise pas aux enfants de moins de 12 ans, sauf avis
contraire d'un dentiste. Consultez un dentiste si les
symptômes persistent chez les adultes ou en cas de
gencives qui saignent chez les enfants. Tenez hors de
portée des enfants. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation.
Ne pas utiliser si le film d'emballage est cassé. Les
enfants du carton ont été cotés. Ne pas utiliser si les
enfants du carton sont ouverts. Signalez tout incident
ou effet secondaire du produit au fabricant, à votre
dentiste ou à un pharmacien ou un dentiste.
Pour les signes qui ne se produisent pas uniquement
lors de saignements des gencives, consultez toujours
votre dentiste.
1 Avec un brossage de 10 secondes par jour par rapport à un
dentifrice sans bicarbonate de sodium.

Ⓢ FLUORIDE TANDPASTA, VOLG ALTIJD DE
AANWIJZINGEN OP DE VERPAK KING. Ploes 2x per dag
en niet vaker dan 3x, slik zo weinig mogelijk door en spug
uit. Niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar, tenzij op
advies van een tandarts. Raadpleeg een tandarts indien
bij volwassenen de symptomen aanhouden of bij kinderen
met bloedend tandvlees. Buiten bereik van kinderen
houden, indien irritatie optreedt, gebruik beëindigen.
Kartonnen verpakkingen zijn niet geschikt. Niet gebruiken als de
verpakking van de dop open is. Met elk productiefact
of bijwerkingen aan de fabrikant, uw voorsprijder of tandarts
of apotheker of tandarts.
Bij kinderen die niet alleen bij bloedend tandvlees
voorkomen, raadpleeg altijd uw tandarts.
1 Big tweemaal daags na het eten vegen met een
tandpasta zonder natriumcarbonaat.

Ⓢ DENTIFRICE AU FLUOR, TOUJOURS SUIVRE CES
CONSEILS. Brossez les dents 2x par jour et pas plus de
3x. Avec le moins de dentifrice possible et recrachez. Ne
cruise pas aux enfants de moins de 12 ans, sauf avis
contraire d'un dentiste. Consultez un dentiste si les
symptômes persistent chez les adultes ou en cas de
gencives qui saignent chez les enfants. Tenez hors de
portée des enfants. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation.
Ne pas utiliser si le film d'emballage est cassé. Les
enfants du carton ont été cotés. Ne pas utiliser si les
enfants du carton sont ouverts. Signalez tout incident
ou effet secondaire du produit au fabricant, à votre
dentiste ou à un pharmacien ou un dentiste.
Pour les signes qui ne se produisent pas uniquement
lors de saignements des gencives, consultez toujours
votre dentiste.
1 Avec un brossage de 10 secondes par jour par rapport à un
dentifrice sans bicarbonate de sodium.

Ⓢ FLUORIDE TANDPASTA, VOLG ALTIJD DE
AANWIJZINGEN OP DE VERPAK KING. Ploes 2x per dag
en niet vaker dan 3x, slik zo weinig mogelijk door en spug
uit. Niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar, tenzij op
advies van een tandarts. Raadpleeg een tandarts indien
bij volwassenen de symptomen aanhouden of bij kinderen
met bloedend tandvlees. Buiten bereik van kinderen
houden, indien irritatie optreedt, gebruik beëindigen.
Kartonnen verpakkingen zijn niet geschikt. Niet gebruiken als de
verpakking van de dop open is. Met elk productiefact
of bijwerkingen aan de fabrikant, uw voorsprijder of tandarts
of apotheker of tandarts.
Bij kinderen die niet alleen bij bloedend tandvlees
voorkomen, raadpleeg altijd uw tandarts.
1 Big tweemaal daags na het eten vegen met een
tandpasta zonder natriumcarbonaat.

Trade marks are owned by or licensed to the Haleon
group of companies. ©2025 Haleon group of companies.

Haleon Medical Devices, Cochrane, Youghal
Road, Dungarvan, Co. Waterford, X55 Y983,
Ireland.

LOT Zie uiterste doosje /
Voir les extrémités du carton /
siehe Kartondeckel

MD

CE 1639



✉ mystory.nl@haleon.com
mystory.be@haleon.com

UDI 2X75 ml e

5 054563 265722 >

